

Onglyza Saxagliptina 5 mg 28 Comprimidos Recubierto



ONGLYZA 2.5-5 mg Comprimidos Recubiertos

Laboratorio: ASTRAZENECA

Drogas:

Saxagliptina

Acciones:

Metabolismo:Hipoglicemiantes Antidiabéticos

Acciones:

- Cada comprimido recubierto contiene: 2.5 mg o 5 mg de Saxagliptina. Forma farmacéutica: Los comprimidos de 5 mg son comprimidos recubiertos redondos, biconvexos, de color rosa, y llevan la marca "5" impresa en una cara y "4215" al reverso, con tinta azul. Los de 2.5 mg son comprimidos recubiertos redondos, biconvexos de color amarillo pálido a claro, y llevan la marca "2.5" impresa en una cara y "4214" al reverso, con tinta azul.
- Hipoglicemiante oral. Inhibidor de la enzima DPP4.



- Onglyza está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control
 glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2 en múltiples entornos
 clínicos. Limitaciones de uso importantes: No debe usarse para el tratamiento de la
 diabetes mellitus tipo 1, ni de la cetoacidosis diabética. No se ha estudiado en pacientes
 con antecedentes de pancreatitis.
- La dosis recomendada de Onglyza es de 2.5 ó 5 mg 1 vez al día, solo o con las comidas. Los comprimidos Onglyza no deben dividirse ni cortarse. La dosis recomendada es de 2.5 mg o 5 mg 1 vez al día, solo o con las comidas. Se recomienda la dosis de 2.5 mg al día para los pacientes con disfunción renal moderada o grave o con nefropatia terminal (DEPcr 50 ml/min). La función renal deberá evaluarse antes de empezar el tratamiento con Onglyza y luego periódicamente. Se recomienda la dosis de 2.5 mg para los pacientes que también están recibiendo inhibidores de las formas 3A4/5 del citocromo P450 (CYP3A4/5), p.ej. el ketoconazol.
- La información completa de prescripción puede ser solicitada a AstraZeneca, Isidora Goyenechea 3477, piso 2, Las Condes. Teléfono (02) 2798 0800.
- Estuche conteniendo 28 comprimidos recubiertos.