

DUCETEN

ABBOTT

Antidepresivo (inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina, analgésico (dolor neuropático del diabético)).

Composición.

Duloxetina clorhidrato 30mg y 60mg.

Indicaciones.

Tratamiento del desorden depresivo mayor. Tratamiento de incontinencia urinaria de esfuerzo (IE) moderada o severa en mujeres. Manejo del dolor neuropático asociado a la neuropatía periférica de origen diabético. Fibromialgias.

Dosificación.

Adultos: por vía oral con o sin alimentos. Antidepresivo (60mg/día administrados 1 vez al día o 2 veces al día en tomas de 30mg c/u). Manejo del dolor neuropático (60mg/día administrados 1 vez al día).

Contraindicaciones.

Hipersensibilidad conocida a duloxetina o alguno de los componentes de la formulación. Insuficiencia hepática. Glaucoma de ángulo cerrado no controlado. Disfunción renal severa. Pacientes en tratamiento con IMAOS. Pacientes en tratamiento tioridazina.

Reacciones adversas.

Que requieren atención médica: retención urinaria. Reacción anafiláctica. Glaucoma. Hepatitis. Hiponatremia. Ictericia. Hipotensión ortostática. Síndrome de Stevens-Johnson. Síncope. *Frecuentes:* anorexia. Disminución del apetito. Constipación. Tos. Diarrea. Vómitos. Dolor de cabeza. Hiperhidrosis. Insomnio.

Sobredosificación.

Ante la sospecha solicite atención médica inmediatamente.

Presentación.

Duloxetina clorhidrato 30mg x 30 cápsulas. 60mg x 30 cápsulas.