

## Neohysticlar Desloratadina 5 mg – Caja x 30 Comprimidos Recubierto



- **NEOHYSTICLAR Comprimidos Recubiertos**

Laboratorio: MINTLAB

***Drogas:***

- Desloratadina

***Acciones:***

- Aparato Respiratorio: Antialérgicos Antihistamínicos

***Acciones:***

- Cada comprimido recubierto contiene: Desloratadina 5 mg. Excipientes: Dióxido de Silicio Coloidal, Croscarmelosa Sódica, Lactosa Monohidrato, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Alcohol Polivinílico Parcialmente Hidrolizado, Dióxido de Titanio, Macrogol 3000, Talco Venecia.
- Alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica estacional.



- **Forma de administración:** Vía oral. Se puede administrar con o sin alimentos. **Dosis:** El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es de 1 comprimido de 5 mg 1 vez al día.
- Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. **Consulte inmediatamente al médico si alguno de estos síntomas ocurre:** reacciones de hipersensibilidad, dificultad al respirar. **Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo:** dolor de cabeza, fatiga, mareos, sequedad de la boca, dolor de músculos.
- **No usar en pacientes con:** Hipersensibilidad a la desloratadina, loratadina o algún componente de la formulación. Lactancia.
- Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Administrar con precaución en pacientes con enfermedad hepática o renal. Si Ud. está embarazada, consulte a su médico antes de empezar a tomar este medicamento. A las dosis recomendadas, la administración de desloratadina no debiera causarle somnolencia.
- El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.
- En caso de ingestión involuntaria, conduzca al intoxicado a un centro de atención médico.
- **Condiciones de almacenamiento:** Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad, a no más de 25 °C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

### Neohysticlar Desloratadina 5 mg 30 Comprimidos Recubierto

La Desloratadina se usa para aliviar la fiebre de heno y los síntomas de alergias, incluyendo los estornudos; rinorrea (secreción nasal); y los ojos enrojecidos, llorosos o con picazón. También se usa para tratar urticarias. La Desloratadina pertenece a una clase de medicamentos llamado antihistamínicos.

### Beneficios

Alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica estacional.

### Principales principios activos

- Cada comprimido recubierto contiene: Desloratadina 5 mg. Excipientes: Dióxido de Silicio Coloidal, Croscarmelosa Sódica, Lactosa Monohidrato, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Alcohol Polivinílico Parcialmente Hidrolizado, Dióxido de Titanio, Macrogol 3000, Talco Venecia.



### **Modo de uso**

Forma de administración: Vía oral. Se puede administrar con o sin alimentos. Dosis: El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es de 1 comprimido de 5 mg 1 vez al día.

### **¿Cuál es la diferencia entre Desloratadina y Loratadina?**

Desloratadina sufre un metabolismo de primer paso menos extenso que Loratadina y su vida media de eliminación es de 27 horas, en comparación con las 12-15 horas de Loratadina. Está indicada en el alivio de los síntomas nasales y no nasales de las rinitis alérgicas y en los síntomas asociados a la urticaria.