

Coplavix Clopidogrel 75 mg 28 Comprimidos





¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?

Prevención de acontecimientos aterotrombóticos en adultos que ya están tomando clopidogrel y AAS. Tratamiento de continuación en: Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento-ST (angina inestable o infarto de miocardio sin onda-Q), incluyendo pacientes sometidos a la colocación de un stent después de intervención coronaria percutánea. Infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolítica.

¿Requiere indicación médica?

Dispensación sujeta a prescripción médica.

¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?

Administrar con o sin alimentos. Si se olvida una dosis: si han pasado menos de 12 h, deben tomar la dosis inmediatamente y la siguiente a la hora habitual; si han pasado más de 12 h, deben tomar la siguiente dosis a la hora habitual y no doblar la dosis. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a clopidogrel, AAS o AINE, asma, rinitis y pólipos nasales. Hemorragia patológica activa (p. ej., úlcera péptica o hemorragia intracraneal). I.H. grave. I.R. grave ($\text{Clcr} < 30 \text{ mL/min}$). 3 er trimestre de embarazo. Pacientes con antecedentes de mastocitosis para los que el AAS puede inducir reacciones graves de hipersensibilidad (incluyendo shock circulatorio con rubefacción, hipotensión, taquicardia y vómitos).