CODIGO/VERSION D-ME-120-30-14179-01 14/DIC/2015 Manuel San Martín **FECHA** ELABORADO POR

INSUMO Instructivo Tramadol Gotas 100 mg/mL DIMENSIONES COLOR PANTONE 168 x 130 mm Negro

Papel Bond 22 56 g/m<sup>2</sup>

EMPAQUE EXTERIOR: Cajas de cartón corrugado debidamente rotuladas y selladas



## SOLUCION ORAL PARA GOTAS 100 mg/mL FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE TRAMADOL CLORHIDRATO

TIRO

exactamente al indicado por su médico. puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento

## COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

# TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCION ORAL PARA GOTAS 100 mg/mL

## FORMULA:

Cada 1 mL de solución oral para gotas contiene: Tramadol clorhidrato 100 mg

esencia de anis, sacarosa, sacarina sódica, agua purificada Excipientes: Glicerol, sorbato de potasio, esencia de menta,

## Analgésico CLASIFICACIÓN:

diagnósticos y terapéuticos dolorosos **INDICACIONES:** Tratamiento del dolor moderado o severo, tanto agudo como crónico, así como procedimientos

ADVERTENCIAS:
"LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE ESTE MEDICAMENTO NO HA SIDO ESTABLECIDA EN PACIENTES MENORES DE 16 AÑOS"

PACIENTES MENORES DE 16 AÑOS"

A SAN MAIO ACTION V hain su pervisión médica.

Tramadol se elimina por la leche materna. Administrar con prudencia a personas con antecedentes o predisposición al abuso de analgésicos.

**CONTRAINDICACIONES:** 

central opiáceos o psicotrópicos, está contraindicado su uso. No administrar a niños menores de 16 años. epilepsia no controlada o que hayan desarrollado reacciones alérgicas al tramadol en ocasiones anteriores. En caso de intoxicación aguda con alcohol, hipnóticos, analgésicos de acción No administrar a personas con insuficiencia respiratoria severa, insuficiencia hepática grave,

Medicamentos inductores del sueño, ansiolíticos (benzodiazepinas), antiácidos, carbamazepina Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos:

y algunos antidepresivos.

**EFECTOS INDESEABLES:** 

Somnolencia, mareo, dolor de cabeza, inquietud, constipación, boca seca, transpiración abundante



## REACCIONES ADVERSAS:

Se han comunicado casos de fatiga, náuseas y vómitos; en algunos casos aislados se han presentado efectos respiratorios y cardíacos. con este producto, consulte a su médico: Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento


## PRECAUCIONES:

Aunque es poco probable, Tramadol puede inducir dependencia física o sicológica en personas propensas y tratamientos prolongados. Embarazo y lactancia: No se recomienda su uso, salvo bajo estricta indicación médica.

no obstante la dosis usual recomendada es: El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento apropiado a su caso en particular, 20 a 40 gotas, (50 a 100 mg), cada 6 a 8 horas.

Para dosificar se debe inclinar el frasco en 45º, como se muestra en la figura:

La dosis diaria total no debe exceder los 400 mg



jugos de fruta. MODO DE EMPLEO: Las gotas, pueden administrarse diluidas en un vaso de agua azucarada o mezcladas con

Los síntomas de sobredosis se caracterizan por somnolencia, alteraciones cardiovasculares, respiratorias, hipotensión y aparición de reflejos. En dosis mayores puede haber pérdida de conciencia, sedación y convulsiones. **SOBREDOSIS:** 

El tratamiento se debe realizar en un establecimiento asistencial, para tratamientos de urgencia adecuado:

# Mantener en su envase original; fuera del alcance de los niños, protegido del calor. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** 

LABORATORIO CHILE S.A Santiago – Chile

www.laboratoriochile.cl

**NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA** NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA.

120-30-14179-01



| Elaborado por: | Revisado por: | V°B° P. Operacionales: |
|----------------|---------------|------------------------|
|                | •             |                        |
|                |               |                        |
|                |               |                        |