

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE**PROSPECTO**

Lea todo el prospecto detenidamente porque puede tener información importante para Ud.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o químico farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Ud. personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

FLEETGLICOL Polvo para solución oral

Composición por	Sobre de 17.6 g	mEq / L
Principios activos:		
Poliolenglicol Poliolenglicol-Macrogol 4000	14.97 g	Na ⁺ : 128.09 SO ₄ ²⁻ : 78.85 HCO ₃ ⁻ : 20.00 Cl ⁻ : 35.48 H ₂ PO ₄ ⁻ : 4.00 K ⁺ : 10.58
Sulfato de sodio sódico anhidro	1.40 g	
Bicarbonato de sodio sódico	0.42 g	
Cloruro de sodio sódico	0.37 g	
Cloruro de potasio potásico	0.19 g	
Bifosfato de sodio sódico	0.12 g	

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**

Excipientes: butilhidroxianisol, aroma de naranja, acesulfamo **de potasio** y sucralosa.

La osmolaridad total de la solución es de aproximadamente 252,68 ~~252~~ mOs/ l

LICENCIANTE Y FABRICANTE

Laboratorios Casen Fleet S. L.
50180 Utebo (ZARAGOZA)



FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

IMPORTADO, ENVASADO Y DISTRIBUÍDO POR
LABORATORIOS RIDER LTDA
Placer 1348, Santiago
Fono: 4990800

1. QUÉ ES FLEETGLICOL POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL Y PARA QUE SE UTILIZA

Fleetglicol Polvo para solución oral se presenta en forma de sobres monodosis en distintas presentaciones de 16 sobres de 17.6 g

Es un evacuante intestinal para preparación previa a la colonoscopia, cirugía, radiología y otros exámenes colorrectales y genitourinarios.

En ocasiones se utiliza para el tratamiento del estreñimiento crónico de causa no orgánica que previamente ha sido tratado, sin resultados satisfactorios, con una dieta de alto contenido en agua y un aumento del ejercicio físico diario.

2. ANTES DE TOMAR FLEETGLICOL Polvo para solución oral.

No tome FLEETGLICOL Polvo para solución oral:

- Si es usted alérgico a los principios activos o a cualquiera de los componentes del producto.
- Si tiene úlcera gástrica o intestinal
- Si tiene retención gástrica
- Si tiene una enfermedad intestinal crónica, íleo o megacolon
- Si presenta una obstrucción intestinal.
- Si tiene una perforación intestinal.

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**

Tenga especial cuidado con FLEETGLICOL Polvo para solución oral;

- Cuando se administre Fleetglicol Polvo para solución oral, especialmente mediante sonda nasogástrica, debe vigilarse para evitar la regurgitación o aspiración de la solución, especialmente en pacientes con reflejo de deglución

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

dañado, reflujo gastroesofágico o en estado de semiinconsciencia o inconsciencia.

- Si se presenta dolor abdominal, la administración se realizará más lentamente o, incluso, se interrumpirá hasta la reversión de los síntomas.
- Si se sospecha la existencia de obstrucción o perforación gastrointestinal, se deben llevar a cabo las exploraciones diagnósticas necesarias antes de la administración de Fleetglicol Polvo para solución oral
- Cuando se administre Fleetglicol Polvo para solución oral en pacientes con colitis severa o proctitis debe emplearse con precaución.

Embarazo y lactancia.

- Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.
- No existe experiencia de utilización de Fleetglicol Polvo para solución oral durante el embarazo y la lactancia. No debe ser empleada durante el embarazo y la lactancia a no ser que sea estrictamente necesario.

Conducción y uso de máquinas:

No ha sido descrito.

Toma de otros medicamentos:

La medicación administrada durante la utilización de Fleetglicol Polvo para solución oral podría eliminarse por el tracto gastrointestinal y no absorberse.

3. COMO TOMAR FLEETGLICOL Polvo para solución oral

Administración oral.

Para la evacuación intestinal con fines diagnósticos o cirugía:

Adultos: Sobres de 17.6 g: La dosis completa es de 16 sobres de 17.6 g. Disolver el contenido de un sobre en 250 mL de agua.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

La solución se administra normalmente por vía oral, ingerida a razón de 200 a 250 mL cada 10-15 minutos, hasta que la totalidad del volumen haya sido ingerido o la deposición sea clara. No se debe tomar ningún alimento durante las 3 o 4 horas anteriores a la administración de la solución y en ningún caso se ingerirá alimento sólido las 2 horas anteriores a la utilización de la misma.

En pacientes incapaces de beber la solución se podrá utilizar sonda nasogástrica a razón de 20-30 mL por minuto.

El movimiento intestinal ocurrirá aproximadamente después de una hora de haber iniciado el tratamiento.

Niños: No hay experiencia clínica.

Para el tratamiento del estreñimiento crónico de causa no orgánica:

Adultos: A razón de 250-500 mL por día.

Insuficiencia renal: No son necesarios cambios de dosificación en pacientes con insuficiencia renal.

Insuficiencia hepática:

No son necesarios cambios de dosificación en pacientes con insuficiencia hepática.

Ancianos: La pauta posológica sería la misma que para adultos.

Duración del tratamiento

Como para todos los laxantes no se recomienda un uso prolongado de Fleetglicol Polvo para solución oral. No utilizar Fleetglicol Polvo para solución oral durante más de seis días sin consultar con su médico.

Dosificación aislada, siempre que se necesita la evacuación intestinal profunda.

Si usted toma más FLEETGLICOL Polvo para solución oral del que debiera:

Consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, Fleetglicol Polvo para solución oral puede tener efectos adversos. Náuseas, sensación de plenitud abdominal y retortijones son las reacciones más comunes. En menor medida, pueden presentarse vómitos, calambres abdominales e irritación anal. Todas estas reacciones adversas son transitorias y ceden rápidamente. Han sido descritos algunos casos aislados de urticaria, rinorrea, dermatitis, originados por reacciones alérgicas.

Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE FLEETGLICOL Polvo para solución oral

MANTENGA FLEETGLICOL POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.

No conservar a temperatura superior a 25° C

Cuando no esté utilizando Fleetglicol Polvo para solución oral puede conservar la solución entre 2° C y 8° C (en refrigeración) y desecharla a las 48 horas después de su preparación.

Caducidad

No utilizar Fleetglicol Polvo para solución oral después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Este prospecto ha sido aprobado en: Febrero 2007

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**