

Combodart 0,5/0,4 Dutasteride 0,5 mg Tamsulosina 0,4 mg – Caja x 30 Cápsulas Blandas



Combodart 0,5/0,4 Dutasteride 0,5 mg Tamsulosina 0,4 mg 30 Cápsulas Blandas

Indicado para el tratamiento de los síntomas de la hiperplasia prostática benigna (HPB) en hombres con una próstata aumentada.

Principales principios activos

- Cada cápsula para uso oral contiene 0,5 mg de Dutasterida y 0,4 mg de Clorhidrato de Tamsulosina

Modo de uso

La dosis recomendada de COMBODART consiste en una cápsula (0,5 mg/ 0,4 mg) administrada vía oral aproximadamente 30 minutos después de la misma comida, cada día. Las cápsulas deben



deglutirse enteras, sin masticarse ni abrirse. El contacto con el contenido de la cápsula dura de Dutasterida podría ocasionar irritación de la mucosa bucofaríngea.

¿Cómo actúa el Combodart?

COMBODART® trata y previene la progresión de la hiperplasia prostática benigna (HPB, del inglés benign prostatic hyperplasia), mediante el alivio de los síntomas, la reducción del tamaño de la próstata (volumen), el mejoramiento de la velocidad de flujo urinario y la reducción del riesgo de retención urinaria aguda

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

Incapacidad para tener o mantener una erección, disminución del deseo sexual, problemas con la eyaculación.