

FICHA TECNICA

COSOPT **SOLUCION OFTALMICA** **HIPOTENSOR ANTI-GLAUCOMATOSO**

Composición:

Cada mL contiene:

Dorzolamida 20 mg

Timolol: 5 mg.

Excipientes c.s.

INDICACIONES

Tratamiento de la presión intraocular elevada en pacientes con hipertensión ocular. Glaucoma pseudoexfoliativo u otros glaucomas secundarios de angula abierto cuando la terapia concomitante es apropiada.

CONTRAINDICACIONES:

Absolutas:

- Tiene o ha tenido en el pasado serios problemas respiratorios como el asma.
- Tiene enfermedad obstructiva crónica.
- Problemas cardíacos (tales como enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca o presión arterial baja).
- Alteraciones del ritmo cardíaco (por ejemplo, latidos cardíacos lentos o irregulares).
- Problemas de mala circulación de la sangre (como el síndrome de Raynaud).
- Problemas pulmonares o respiratorios (como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica).
- Diabetes u otros problemas de azúcar en la sangre.
- Enfermedad de la tiroides.

Relativas:

- Embarazo
- Alergias a algún medicamento.

ADVERTENCIAS:

Cosopt contiene cloruro de benzalconio como preservativo. Este preservativo puede depositarse en lentes de contacto suaves.

PRECAUCIONES:

Durante la lactancia. No se debe usar si está amamantando.

En caso de embarazo consulte con su médico.

Niños: Hay una experiencia limitada en cuanto a su uso.

En caso de irritación ocular o cualquier otro problema nuevo en sus ojos, llame a su doctor inmediatamente.

INTERACCIONES:

El componente Dorzolamina es un inhibidor de la anhidrasa carbónica y aunque se administra tópicamente es absorbida sistémicamente.

Precaución al coadministrar un bloqueador beta adrenérgico como el Cosopt y antagonistas del calcio en forma oral o intravenosa.

Puede potenciar la acción de digitalis y antagonistas del calcio.

REACCIONES ADVERSAS:

Oculares: Inflamación palpebral, irritación, enrojecimiento, miopía transitoria.

Sistema nervioso: Cefaleas, astenia/fatiga.

Hipersensibilidad: Reacciones alérgicas sistémicas.

Cardiovasculares: Bradicardia, arritmia, hipotensión, palpitaciones.

Respiratorias: Broncoespasmo, insuficiencia respiratoria.

POSOLOGIA:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

1 gota en el (los) ojos afectado(s) en la mañana y en la noche.

PRESENTACION:

Cosopt solución oftálmica. Frascos con 5 y 10 mL de Solución.

Almacenar a temperatura ambiente y protegido de la luz.

Registro ISP Nro. F-1875

ALPES CHEMIE S.A.