

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

CAVAMED COMPRIMIDOS 5 mg

GLUCAMON^{MR}
CAVAMED COMPRIMIDOS 5 mg

WARFARINA SODICA

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o **al químico**-farmacéutico. Conserve este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda.

COMPOSICION:

Cada comprimido contiene:

Warfarina sodica 5,0 mg

Excipientes c.s.:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES	
03 AGO. 2012	
N° Ref:	RF 322639/11
N° Registro:	F-19571/12
Firma Profesional:	

1.- ¿Para qué se usa?

~~Este medicamento está indicado en la profilaxis y tratamiento de la trombosis venosa y embolia pulmonar, en las complicaciones trombo embólicas asociadas a fibrilación auricular y/o reemplazo de válvulas cardíacas y para reducir el riesgo de infarto al miocardio recurrente y eventos trombo embólicos como accidente cerebro vascular luego de haberse producido un infarto agudo al miocardio.~~

Profilaxis y/o tratamiento de: trombosis venosa y de su extensión, embolismo pulmonar, fibrilación auricular con embolización y como un coadyuvante en la profilaxis del embolismo sistémico posterior a infarto del miocardio.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 2 - 10 mg./ día. La cual debe adecuarse según el INR de cada paciente, por lo que se requiere un estricto control de este parámetro.

- Consejo de cómo administrarlo

Se puede tomar con líquidos o con comida.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. Es probable que su médico le envíe a hacerse exámenes de sangre periódicos, con el fin de saber si la dosis del medicamento que usted usa es la adecuada.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**CAVAMED COMPRIMIDOS 5 mg****3.- Precauciones****- Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con warfarina.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de warfarina.

- Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa, ya que este medicamento puede causar visión borrosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al feto, no se debe utilizar durante el embarazo, asegúrese de que su médico sepa que se encuentra embarazada o puede estarlo, antes de tomar este medicamento.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

- Lactantes y niños

Los niños son más sensibles a los efectos adversos de este medicamento, el pediatra debe evaluar el tratamiento recomendable para su niño.

- Precauciones especiales

Es conveniente que usted sea controlado por su médico en forma frecuente

Antes de realizarse una cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Se recomienda utilizar una identificación donde diga que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

No utilice más medicamento que el indicado por su médico

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a warfarina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones**- Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos:

acetaminofeno (paracetamol), alopurnol, aminoglutemida, antibióticos, antiarrítmicos, antiácidos, antimicóticos, clorfenamina, hidroxicina, loratadina, ácido acetisalicílico (aspirina), glibenclamida, metformina, disulfiram, fenobarbital, diazepam,

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

CAVAMED COMPRIMIDOS 5 mg

clonazepam, cloramfenicol, colestiramina, clorfibrato.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de diabetes mellitus, hipertensión, alergias.

- Alimentos

Debe evitar comer en mucha cantidad vegetales verdes y comidas ricas en vitamina K como: hígado, brócoli, coliflor, espinacas.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico, éstos son: color azulado en los dedos de los pies, orina oscura, dificultad para orinar, úlceras en la boca y garganta, fiebre, escalofríos, disminución en la cantidad de orina, inflamación de la cara, pies o piernas, mareos, ganancia de peso, piel y ojos amarillos.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: visión doble, pérdida del apetito, caída del cabello.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: hemorragia de las encías, moretones, hemorragias inusuales, hemorragia menstrual inusual, dolor abdominal, sangre en la orina, sangre en heces, constipación, mareos, dolor de cabeza severo, dolor articular, vómitos con sangre. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a no más de 30°C.

Protéjase de la luz.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.**

Reg. ISP N°-

Logo Royal Pharma.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE**

1892