

PRODUCTO

Producto	Pluster 50 MCG 120 Dosis (Pet)
EAN 13	7795380002388
DUN 14	7804625950992
Peso	884 g
Paletización	20 unidades por caja
Unidad de Venta	Estuche
Código de barra	7795380002388

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Marca:	Pluster
Molécula:	Mometasona
Concentración:	50 mcg/puff o dosis
Forma Farmacéutica	Suspensión acuosa para nebulización nasal
Volúmen (g,kg,L,unidades)	50 MCG 120 Dosis
Registro ISP	F-22337
Importador	Deutsche Pharma S.A.
Fabricante	Roemmers
Bodegaje y distribución	Novofarma Service S.A, Victor Uribe 2280-Quilicura, Santiago Chile.
Fórmula	Mometasona furoato 50,00 mcg. Excipientes: Glicerol, Polisorbato 80, Alcohol feniletílico, Acido cítrico anhidro, Celulosa microcristalina y carmelosa sódica, Citrato de sodio dihidratado, Solución de Cloruro de benzalconio al 10%, Agua purificada c.s.
Precauciones	Véase folletos de información al paciente y profesional.
Indicaciones/dosis	Indicado para ser utilizado en adultos, adolescentes y niños de entre 2 y 11 años de edad para el tratamiento de la rinitis estacional o perenne.
Dimensiones	Dimensiones envase primario: 3 x 8,1 x 2 cm Dimensiones envase secundario: 20,8 x 18,8 x 16 cm
Descripción de contenido	Suspensión blanca y opaca exenta de maerial extraño visible, contenida en frasco tubo de vidrio ámbar.
Modo de uso	Preparación inicial del aplicador: La primera vez que se utilice el aplicador, agitar el envase, retirar la tapa, colocar los dedos índice y anular sobre las aletas del mismo y el pulgar en el fondo del envase, y accionar el aplicador nasal (6 a 7 veces) hasta observar un spray fino, de esta manera la bomba dosificadora quedará lista para su uso.
Vida útil	36 meses.
Indicaciones	PLUSTER Indicado para ser utilizado en adultos, adolescentes y niños de entre 2 y 11 años de edad para el tratamiento de la rinitis estacional o perenne.

Pluster[®]
Mometasona Furoato



Posología

Adultos y niños mayores de 12 años:
Dosis inicial: Dos pulverizaciones (100 mcg) en cada fosa nasal, una vez por día (dosis diaria total 200 mcg).
Dosis de mantenimiento: Luego de algunos días, en la medida que los síntomas han sido controlados, se puede disminuir la dosis a una pulverización en cada fosa nasal una vez por día (dosis diaria total 100 mcg).

Interacciones medicamentosas

Se ha informado acerca de la administración concomitantemente con loratadina sin que se registraran efectos aparentes sobre las concentraciones plasmáticas de loratadina o de sus principales metabolitos. No se detectaron concentraciones plasmáticas Mometasonafuroato.

Contraindicaciones

Mometasona está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.