

Fecha de elaboración: abr-19
 Fecha de modificación: Versión 1
 Modificaciones realizadas: NA

FICHA TÉCNICA DEUTSCHE PHARMA	
Nombre producto:	PLUSTER 50 MCG 120 DOSIS (PET)
EAN 13:	7795380002388
DUN 14:	7804625950992
Paletización:	20 unidades por caja
Peso:	884 g
Unidad de venta (empaquete):	Estuche
Código de barra:	7795380002388
TÉCNICO	
CARA PRINCIPAL	
Marca:	Pluster
Molécula:	mometasona
Concentración:	50 mcg/puff o dosis
Forma Farmacéutica:	suspensión acuosa para nebulización nasal
Volúmen (g,kg,L,unidades)	50 MCG 120 Dosis
CARA 1 (LATERAL)	
Registro ISP:	F-22337
Importador:	Deutsche Pharma S.A.
Fabricante:	Roemmers
Bodegaje y distribución:	Novofarma Service S.A, Victor Uribe 2280-Quilicura-Santiago
Otros:	
CARA 2 (LATERAL)	
Fórmula:	Mometasona furoato 50,00 mcg. Excipientes: Glicerol, Polisorbato 80, Alcohol feniletílico, Acido cítrico anhidro, Celulosa microcristalina y carmelosa sódica, Citrato de sodio dihidratado, Solución de Cloruro de benzalconio al 10%, Agua purificada c.s.
Precauciones:	vease folletos de información al paciente y profesional
Vía de administración:	topica nasal
Indicaciones y dosis:	Indicado para ser utilizado en adultos, adolescentes y niños de entre 2 y 11 años de edad para el tratamiento de la rinitis estacional o perenne. En pacientes que tienen una historia de signos y síntomas moderados a severos de rinitis alérgica estacional, se recomienda el tratamiento profiláctico con Mometasona furoato entre 2 y 4 semanas antes del comienzo estimado de la etapa de polinización. Indicado en adultos y adolescentes mayores de 12 años de edad como un tratamiento adicional a los antibióticos en los episodios de sinusitis aguda. Indicado en pacientes de 18 años o más años de edad para el tratamiento de los pólipos nasales y los síntomas asociados incluyendo congestión y anosmia
Otros:	

OTRA INFORMACIÓN FICHA TÉCNICA	
Dimensiones envase primario:	N/A
Dimensiones envase secundario:	3 x 8,1 x 2 cm
Características del envase:	20,8 x 18,8 x 16 cm
Descripción del contenido:	Suspensión blanca y opaca exenta de maerial extraño visible, contenida en frasco tubo de vidrio ámbar.
Acción terapéutica:	vease folletos de información al paciente y profesional
Indicaciones:	Indicado para ser utilizado en adultos, adolescentes y niños de entre 2 y 11 años de edad para el tratamiento de la rinitis estacional o perenne.
Modo de uso:	vease folletos de información al paciente y profesional
Posología:	vease folletos de información al paciente y profesional
RAM:	NA
Interacciones medicamentosas:	vease folletos de información al paciente y profesional
Contraindicaciones:	vease folletos de información al paciente y profesional
Período de eficacia:	36 meses
Contaminabilidad:	NA
Inflamabilidad:	NA

