

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE
LISUR Comprimidos Recubiertos 200 mg

Documento: IPAC-1016

Fecha: Dic.2011

RF354492/12

REG. ISP N° F-19616/12

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
LISUR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg

Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico.

ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, TENGA PRESENTE
Su médico le ha explicado las propiedades de este medicamento y los riesgos asociados para el alivio de su enfermedad.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
CALLE ROSARIO 120, SANTIAGO	
10 OCT. 2012	
N° Ref.:	RF 354492/12
N° Registro:	F-19-616/12
Firma Profesional:	[Firma]

Composición y Presentación:

Cada comprimido recubierto de LISUR Comprimidos Recubiertos 200 mg contiene:

Flavoxato Clorhidrato

200 mg

Excipientes

Povidona; Lauril sulfato de sodio; Crospovidona; Lactosa monohidrato; Celulosa microcristalina; Colorante FD&C azul N°1 lacado; Colorante FD&C amarillo N°5 lacado (tartrazina); Estearato de Magnesio; Talco, alcohol

Recomendaciones de Uso o Indicaciones:

Tratamiento de la disuria (dolor al orinar), [REDACTED] (necesidad de orinar que no deja dormir), dolor suprapúbico, frecuencia o incontinencia urinaria que pueden aparecer en cistitis, prostatitis, uretritis, uretrocistitis, uretrotrigonitis.

Esta indicado también como coadyuvante en el tratamiento antiespástico de cálculos renales y ureterales, y disturbios espásticos urinarios producidos por cateterismo y citoscopia. Secuelas de intervenciones quirúrgicas sobre las vías urinarias bajas. En el tratamiento sintomático de los estados espásticos de las vías genitales femeninas como dolor pélvico y dismenorrea.

Advertencias y Precauciones:

No se recomienda su uso durante el embarazo ni en menores de 12 años, por no haberse establecido su seguridad en dichos casos.

Precaución en pacientes con glaucoma, especialmente en la forma de ángulo cerrado, y pacientes en tratamiento que deban conducir vehículos, manejar maquinaria peligrosa o realizar trabajos de precisión, por la posibilidad de aparición de efectos secundarios como somnolencia, visión borrosa y vértigo. Se recomienda no consumir alcohol durante el tratamiento, ya que puede aumentar la somnolencia producida por el flavoxato.

No se conoce si Flavoxato es distribuido a la leche materna, por lo que debe ser utilizado con

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE LISUR Comprimidos Recubiertos 200 mg	
Documento: IPAC-1016	Fecha: Dic.2011
RF354492/12	REG. ISP N° F-19616/12
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE LISUR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg	

cuidado en mujeres que amamantan.

Contraindicaciones:

Condiciones obstructivas (pilórica o duodenal de intestino o íleon). Acalasia (incapacidad del esófago para movilizar el alimento). Hemorragia gastrointestinal. Uropatías obstructivas del tracto urinario bajo, lesiones obstructivas intestinales o del íleon.

Interacciones con otros fármacos:

No se conocen interacciones importantes.

Efectos Adversos.

Han sido observados los siguientes efectos adversos:

Náuseas, vómitos (que en general desaparecen si se ingiere el fármaco después de las comidas), sequedad de boca.

Vértigo, dolor de cabeza, confusión mental (especialmente en ancianos), somnolencia (que en general disminuye si se reduce la dosis administrada o se amplía el intervalo entre las administraciones), nerviosismo.

Leucopenia (disminución glóbulos blancos)

Taquicardia y palpitaciones.

Urticarias y otras dermatosis.

Incremento de la presión ocular, visión borrosa, disturbios en la acomodación ocular.

Forma de Administración y Dosis:

Su médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento adecuado para su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de 200 mg 3 veces por día.

Sobredosis:

El producto tiene una toxicidad baja, en especial por vía oral. Estudios en animales revelaron que su toxicidad aguda es mayor de 1000 mg por kg de peso. *Los síntomas de sobredosis pueden ser:* convulsiones, disminución de la capacidad para sudar (calor, enrojecimiento de piel, sequedad de boca e incremento de la temperatura corporal), alucinaciones, incremento de la velocidad cardíaca y presión arterial, confusión mental.

Tratamiento: en caso de ingestión accidental debe dirigirse a un centro asistencial dentro de las 4 horas que siguen a la toma del medicamento, para proceder a lavado gastrointestinal.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE**

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE
LISUR Comprimidos Recubiertos 200 mg

Documento: IPAC-1016

Fecha: Dic.2011

RF354492/12

REG. ISP N° F-19616/12

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
LISUR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: *Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.*

Almacenar a temperatura ambiente [REDACTED].

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE