

Hysticlar Loratadina 5 mg Jarabe 100 MI





HYSTICLAR[®] Jarabe

Laboratorio: MINTLAB

Drogas:

- Loratadina

Acciones:

- Aparato Respiratorio: Antialérgicos Antihistamínicos

Acciones:

- Cada 5 ml de jarabe contiene: Loratadina 5 mg. Excipientes: Sacarina Sódica Dihidrato, Benzoato de Sodio, Ácido Cítrico Anhidro, Sacarosa, Propilenglicol, Polividona, Esencia de Cereza, Agua Purificada.
- Antihistamínico (antialérgico).
- Los antihistamínicos (antialérgicos) se utilizan en el tratamiento de la congestión nasal (narices tapadas), estornudos y rinorrea (moqueo) y en alergias de diversos tipos. Este medicamento debe ser usado sólo por indicación de su médico.
- **Vía de administración:** Oral. **Forma de administración:** Use este medicamento siguiendo las indicaciones médicas, no use más o con mayor frecuencia que la que **Dosis:** El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es de 10 mg. La forma de administración debe modificarse en pacientes con alteración en la función renal y/o hepática.
- Pueden ocurrir efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico. En menos del 2% de los pacientes tratados con loratadina se detectó hiperquinesia, tremor, vértigo, constipación, diarrea, flatulencia, gastritis, vómitos, boca seca, fatiga, náuseas, hipertensión, hipotensión, taquicardia, dolores musculares, fotosensibilidad, ansiedad, confusión, bronquitis, broncoespasmos, laringitis, congestión nasal, sinusitis, tos, faringitis, conjuntivitis, visión borrosa, dermatitis, prurito, urticaria, ictericia y hepatitis. Si Ud. nota cualquier efecto molesto no mencionado consulte a su médico.
- **Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:** Insuficiencia hepática o renal. Alergia a loratadina o compuestos similares.
- Antes de usar este medicamento deben sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. **Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:** **Alergias:** Ud debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos. **Embarazo:** Ud. debe comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo. **Lactancia:** Ud. debe conversar con el médico acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras esté amamantando. Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que no se recomienda



su administración en mujeres que estén amamantando. A pesar de no haberse reportado efecto de este medicamento sobre la capacidad para conducir vehículos u operar maquinaria, se recomienda precaución en estos casos. Estos son usualmente más sensibles al efecto de los antihistamínicos. Ud. debe comunicar a su médico si presenta insuficiencia hepática o renal. Este medicamento contiene sacarosa, precaución en pacientes diabéticos. Evitar la ingestión de alcohol durante el tratamiento. El tratamiento debe suspenderse 48 horas antes de iniciar cualquier tipo de prueba cutánea.

- El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco. La administración conjunta con ketoconazol, eritromicina o cimetidina se ha asociado con un incremento en la concentración plasmática de loratadina.
- En caso de intoxicación con loratadina el paciente debe ser trasladado a un servicio de urgencia.
- **Condiciones de almacenamiento:** Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad, a no más de 25° C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
 - No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.