PLANIDEN ODT 5 MG Comprimidos Dispersables

Laboratorio

ABBOTT

Drogas

Clotiazepam

Clases Terapéuticas

Sistema Nervioso Central: <u>Tranquilizantes Ansiolíticos</u>

Información farmacológica

- Composición: Cada comprimido dispersable contiene: Clotiazepam 5 mg.
- **Indicaciones:** Tratamiento de la ansiedad generalizada.
- Posología: La dosis usual recomendada es: Adultos: 5 mg, 2 a 3 veces al día (10 a 15 mg/día). Casos más severos: 5 mg 3 veces al día o 10 mg 2 a 3 veces al día. Pacientes ancianos o con insuficiencia renal y/o hepática: Se recomienda disminuir la dosis, por ejemplo, a la mitad de la dosis promedio. La duración total del tratamiento no debe exceder las 8 a 12 semanas para la mayoría de los pacientes, incluyendo el período de reducción paulatina de la dosis. Este medicamento se debe administrar por vía oral. Los comprimidos dispersables se desintegran rápidamente en la boca, pueden ser fácilmente tragados con o sin agua. Al suspender la terapia seguir las instrucciones del médico para ir reduciendo gradualmente la dosis, antes de dejar de utilizarlo por completo.
- Contraindicaciones: Antecedentes de hipersensibilidad a clotiazepam o a cualquiera de los excipientes de la formulación. Insuficiencia respiratoria grave. Síndrome de apnea del sueño. Insuficiencia hepática grave aguda o crónica (riesgo asociado de encefalopatía). Miastenia gravis. Glaucoma de ángulo cerrado. Antecedentes de dependencia a benzodiazepinas, alcohol u otras sustancias.
- Interacciones Medicamentosas: Se han descrito interacciones con los siguientes productos: alcohol; otros depresores del SNC como antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos/sedantes, antidepresivos, analgésicos narcóticos, antiepilépticos, anestésicos, antihistamínicos sedantes; inhibidores enzimáticos (ej., cimetidina, claritromicina, eritromicina, diltiazem, verapamilo, fluoxetina, fluvoxamina, indinavir, ritonavir); itraconazol y ketoconazol; clozapina.
- **Presentaciones:** Envase conteniendo 30 comprimidos dispersables.