

Ficha Técnica Monez Resumen Página Web

Composición y presentación Cada bombeo de la suspensión nasal entrega: Mometasona Furoato: 50 mcg

Posología y Forma de Uso

Después del cebado inicial de la bomba de la suspensión nasal Monez (normalmente 5-10 bombeos o hasta que aparezca un spray fino), cada bombeo 50 microgramos de furoato de mometasona. Agitar bien el recipiente antes de cada uso.

Adultos (incluyendo pacientes geriátricos) y adolescentes de 12 años y mayores: La dosis usual recomendada para profilaxis y tratamiento es de 2 bombeos (50 microgramos/bombeo) en cada fosa nasal, 1 vez al día (dosis total de 200 microgramos). Una vez que los síntomas se han controlado, la reducción de la dosis a 1 rociado en cada fosa nasal (dosis total de 100 microgramos)

Niños de 2 a 11 años: La dosis usual recomendada es de 1 bombeo (50 mcg/bombeo) en cada fosa nasal 1 vez al día (dosis total 100 microgramos). La utilización de este medicamento por parte de un niño debe ser vigilada por un adulto.

Advertencias:

No debe usar este medicamento si está embarazada o en periodo de lactancia a menos que se lo indique su médico.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes de Monez suspensión nasal spray 50 mcg/dosis.

Precauciones:

No debe utilizarse en caso de infección localizada no tratada que afecte la mucosa nasal o en caso de pacientes que hayan tenido una cirugía nasal reciente o traumatismos nasales, hasta ocurrida una curación y cicatrización completa.

Antes de iniciar el tratamiento debe comunicar a su médico si padece algunas de las siguientes condiciones: úlceras en la nariz, tuberculosis (historia de tuberculosis o tuberculosis activa), infección (fúngica o bacteriana o vírica) infección ocular por herpes simplex (virus).

No debe aumentar la dosis prescrita y debe contactarse con su médicos si sus síntomas no mejoran o si la condición empeora.

El producto debe ser usado con precaución para que no se produzca contacto con los ojos.

Interacciones:

Las concentraciones de furoato de mometasona en sangre normalmente no son detectables. Por lo tanto, la terapia combinada con otros fármacos es bien tolerado.

Reacciones Adversas:

Rinitis alérgica estacional o perenne: Los efectos adversos locales incluyen cefalea, sangramiento de fosas nasales, (que puede incluir sangrado, mucosidades nasales con muestras de sangre o pequeños puntos de sangre), faringitis, ardor nasal, irritación nasal y ulceración nasal, los cuales son usualmente

observados con el uso de corticoides nasales en spray. En forma muy infrecuente se han comunicado alteraciones del gusto y del olfato.

Poliposis nasal: los tipos de eventos adversos observados en pacientes con poliposis nasal, fueron similares a los observados para pacientes con rinitis alérgica.

En el tratamiento concomitante para los episodios de sinusitis aguda: Los eventos adversos relacionados al tratamiento que se observaron incluyeron cefalea, faringitis, sensación nasal como dolor punzante e irritación nasal.