

Diseñado para manejar altos niveles de exudado a costos considerablemente más bajos.

Gracias a su absorción vertical, este innovador apósito estéril, disminuye el riesgo de maceración en los bordes de las heridas.


Útil en úlceras venosas, úlceras por presión, úlceras por pie diabético y otras que produzcan gran cantidad de exudado.


# **CARACTERÍSTICAS:**

- Su interior de policrilato de sodio y celulosa, absorbe exudado junto con las metaloproteasas y bacterias presentes en él, las retiene dentro de su estructura.
- Posee una cubierta interna antiadherente de color blanco y una capa superior hidrófoba de color verde, que evita la fuga de fluidos. Ambas de material no tejido de polipropileno.

### **VENTAJAS:**

- · Absorbe más que las espumas tradicionales.
- Remueve el exceso de metaloproteasas (MMP) y las bacterias presentes en el exudado.
- Permite disminuir la frecuencia de cambio de apósitos en heridas altamente exudativas.
- · Puede usarse en conjunto con terapias compresivas.
- Mantiene el medio ambiente húmedo y optimiza la cicatrización.









#### **BENEFICIOS:**

- Altamente absorbente.
- Fácil aplicación y remoción.
- Confortable de usar.
- Superficie permanece seca al tacto.
- · Gentil con su presupuesto.
- Puede ser utilizado tanto como un apósito primario o secundario.


#### **INSTRUCCIONES DE USO:**

Indicaciones: Heridas exudativas limpias o infectadas como heridas operatorias, úlceras venosas, úlceras por presión, úlceras de pie diabético y otras con altos niveles de exudado.

- 1. Seleccione un tamaño de Apósito que permita dejar 2.5 cms, como mínimo, superpuestos sobre la piel intacta.
- 2. Para las heridas profundas, utilice rellenos absorbentes tales como Tegaderm® Alginato o Tegaderm® Alginato Ag.
- 3. Aplique el apósito Tegaderm® Superabsorber con el lado blanco hacia la herida. El lado verde es el respaldo hidrófobo que evita la fuga de exudado a través del apósito.
- 4. Fije el apósito en los bordes con cinta adhesiva u otro aseguramiento, como Cinta de Silicona® de 3M o Cinta Medipore® H de 3M.
- 5. En heridas infectadas, cambie según protocolo de su institución.

## PRECAUCIONES DE USO:

- Usar con lado blanco en contacto con la herida.
- No usar en contacto con mucosas, vísceras, huesos o tendones, ni en heridas con bajo nivel de exudado.
- No utilizar apósito Tegaderm® Superabsorber para rellenar cavidades, ya que aumenta de volumen al absorber el exudado.
- No cortar ni resterilizar.



CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MEDIDAS	UNIDAD DE VENTA: CAJA	UNIDADES POR CAJA
90701	3M® Tegaderm® Superabsorber	10 x 10 cm	Caja	10
90702	3M® Tegaderm® Superabsorber	20 x 10 cm	Caja	10

## www.3msalud.cl

3M Chile S.A.
División Salud
Santa Isabel 1001
Providencia, Santiago
Atención al Consumidor: 600 300 3636
atencionconsumidor@3m.com

