



TECNOFARMA

Contumax 3350 Macrogol 3350 Caja por 15 Sobres solución oral de 17 gr



BENEFICIOS Y USOS

Contumax 3350 Macrogol 3350 7 gr 15 Sobres solución oral

Macrogol 3350 presenta una actividad osmótica que produce una retención de agua en la materia fecal que aumenta su volumen, disminuye su consistencia y facilita su eliminación. El producto no es absorbido y se demostró una recuperación completa del macrogol 3350 en sujetos normales sin constipación. En sujetos constipados la recuperación es altamente variable e incompleta. En estudios in vitro se demostró indistintamente que macrogol 3350 no es fermentado a hidrógeno o metanol por la microflora colónica en las heces humanas.

Beneficios

No se ha demostrado que Macrogol 3350 tenga algún efecto sobre la absorción activa y la secreción de glucosa o electrolitos. No produce taquifilaxia.

Principales principios activos

- Macrogol 3350.



¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?

El macrogol o polietilenglicol 3350 es un laxante que se utiliza para aliviar el estreñimiento ocasional. También es utilizado como parte del régimen de limpieza intestinal en la preparación de colon previo a exámenes de exploración, radiológicos y cirugías.

¿Este medicamento requiere indicación médica?

Sí, el uso de macrogol requiere diagnóstico e indicación médica. La dosis debe ser indicada por el especialista de manera personalizada, dependiendo de la condición particular de cada paciente y la respuesta a la terapia. Este tipo de medicamentos puede generar hábito, por lo que no se debe administrar por largos periodos de tiempo ni de manera continua.

¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?

Dentro de sus efectos adversos se encuentran náuseas, vómitos, diarrea, hinchazón, dolor abdominal, entre otros. Si usted presenta síntomas como dolor abdominal no diagnosticado, fiebre, náuseas y vómitos es recomendable que consulte a su médico quien evaluará su condición y le indicará el tratamiento más adecuado a su caso particular.

¿Cómo debo usar este producto?

Debe prepararse según indicación médica. El polvo debe mezclarse con agua antes de administrar, no consuma el polvo directamente. Una vez preparado se debe consumir dentro de las siguientes 48 horas. Si se encuentra indicado previo a un examen o procedimiento se recomienda suspender la ingesta de alimentos una vez iniciada la administración de este medicamento y beber únicamente líquidos claros.

Presentación

Este medicamento se presenta en forma de sobres.

Modo de almacenamiento

Se debe almacenar a temperatura ambiente (no más de 25°C) y protegido de la luz. No requiere refrigeración.

¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el Macrogol?

El efecto de Macrogol empieza a aparecer dentro de las 24 a 48 horas después de la administración. El tratamiento debe mantenerse durante el menor tiempo posible. No tome Macrogol durante más de 7 días, salvo que se lo haya indicado su médico.

FICHA TECNICA

Contumax 3350 Macrogol 3350 7 gr 15 Sobres solución oral

Macrogol 3350 presenta una actividad osmótica que produce una retención de agua en la materia fecal que aumenta su volumen, disminuye su consistencia y facilita su eliminación. El producto no es absorbido y se demostró una recuperación completa del macrogol 3350 en sujetos normales sin constipación. En sujetos constipados la recuperación es altamente variable e incompleta. En estudios in vitro se demostró indistintamente que macrogol 3350 no es fermentado a hidrógeno o metanol por la microflora colónica en las heces humanas.



Beneficios

No se ha demostrado que Macrogol 3350 tenga algún efecto sobre la absorción activa y la secreción de glucosa o electrolitos. No produce taquifilaxia.

Principales principios activos

- Macrogol 3350.

¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?

El macrogol o polietilenglicol 3350 es un laxante que se utiliza para aliviar el estreñimiento ocasional. También es utilizado como parte del régimen de limpieza intestinal en la preparación de colon previo a exámenes de exploración, radiológicos y cirugías.

¿Este medicamento requiere indicación médica?

Sí, el uso de macrogol requiere diagnóstico e indicación médica. La dosis debe ser indicada por el especialista de manera personalizada, dependiendo de la condición particular de cada paciente y la respuesta a la terapia. Este tipo de medicamentos puede generar hábito, por lo que no se debe administrar por largos periodos de tiempo ni de manera continua.

¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?

Dentro de sus efectos adversos se encuentran náuseas, vómitos, diarrea, hinchazón, dolor abdominal, entre otros. Si usted presenta síntomas como dolor abdominal no diagnosticado, fiebre, náuseas y vómitos es recomendable que consulte a su médico quien evaluará su condición y le indicará el tratamiento más adecuado a su caso particular.

¿Cómo debo usar este producto?

Debe prepararse según indicación médica. El polvo debe mezclarse con agua antes de administrar, no consuma el polvo directamente. Una vez preparado se debe consumir dentro de las siguientes 48 horas. Si se encuentra indicado previo a un examen o procedimiento se recomienda suspender la ingesta de alimentos una vez iniciada la administración de este medicamento y beber únicamente líquidos claros.

Presentación

Este medicamento se presenta en forma de sobres.

Modo de almacenamiento

Se debe almacenar a temperatura ambiente (no más de 25°C) y protegido de la luz. No requiere refrigeración.

¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el Macrogol?

El efecto de Macrogol empieza a aparecer dentro de las 24 a 48 horas después de la administración. El tratamiento debe mantenerse durante el menor tiempo posible. No tome Macrogol durante más de 7 días, salvo que se lo haya indicado su médico.