



Abbott

## FICHA TÉCNICA

# Luvox®

Fluvoxamina



PRODUCTO	
Nombre	LUVOX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 mg
Principio Activo	FLUVOXAMINA MALEATO
Excipientes	Manitol, almidón de maíz, almidón pre-gelatinizado, estearil fumarato de sodio, dióxido de silicio coloidal anhidro, hipromelosa, polietilenglicol 6000, talco, dióxido de titanio (E171).
Registro ISP	F-20498
Fecha de Aprobación	10-12-2013
Equivalencia Terapéutica	Referente
Vías de Administración	Oral
Período de Eficacia	24 meses
Período de Estabilidad Refrigerada	No aplica
Período de Estabilidad Temp. Ambiente en Envase Primario	24 meses
ENVASE	
Condiciones de Almacenamiento	Almacenado a no más de 30°C
Unidad de Medida	Comprimidos recubiertos

Envase Primario	Blister pack de PVC-PVDC/Aluminio impreso.
Envase Secundario	Estuche de cartulina impreso

FABRICANTES	
Principios Activos/ Gmp Api	LONZA AG CHEMICAL LIMITED
Fabricante/ Gmp Planta/Pt	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.
Distribuidor/ Gmp Planta	LABORATORIOS RECALCINE S.A.

INFORMACIÓN GENERAL	
ACCIÓN TERAPÉUTICA	
Antidepresivo	
INDICACIONES	
Tratamiento de enfermedad depresiva y los síntomas de desorden depresivo. Tratamiento de síntomas de trastornos obsesivo compulsivos (TOC).	

## POSOLOGÍA

### Depresión

La dosis de inicio recomendada es 50 o 100 mg, administrada como una dosis única en las primeras horas de la noche. En caso necesario se recomienda aumentar la dosis en forma gradual hasta alcanzar una dosis efectiva, dependiendo de la respuesta individual del paciente. Se han administrado dosis de hasta 300 mg por día. Las dosificaciones por sobre 150 mg debieran administrarse en dosis divididas. De acuerdo con la declaración del consejo de la OMS el tratamiento farmacológico antidepresivo debiera continuarse por al menos seis meses luego de la recuperación de un episodio depresivo.

### Trastornos obsesivo compulsivos

La dosis de inicio recomendada es de 50 mg por día por 3-4 días. La dosis efectiva generalmente fluctúa entre 100 mg y 300 mg por día. La dosis debiera aumentarse gradualmente hasta alcanzar la dosis efectiva, con un máximo de 300 mg por día. Como dosis única pueden administrarse dosis de hasta 150 mg, preferentemente en las primeras horas de la noche. Se aconseja que una dosis total diaria superior a 150 mg sea administrada en 2 o 3 dosis divididas.

## CERTIFICACIONES

Autoridad  
Regulatoria de  
Países de alta  
Vigilancia

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a Fluvoxamina o a alguno de los componentes de la formulación.

Uso concomitante con tizanidina e inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs).

Uso concomitante con ramelteon.