

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ENALAPRIL MALEATO COMPRIMIDOS 20 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento: Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está según, de algo, pregunte a su Médico o Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada comprimido contiene:

Enalapril Maleato 20 mg

Excipientes: Hipromelosa, celulosa microcristalina, Lactosa, croscarmelosa de sodio, Dioxido de silicio coloidal anhidro, talco, Estearato de magnesio, c.s.

Envase con X presentaciones autorizadas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administración por vía oral

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA

Antihipertensivo.

INDICACIONES

Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina que se utiliza para el control de la hipertensión arterial y para la prevención de la insuficiencia cardíaca en conjunto con otros tratamientos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Mayores de 60 años:

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con Enalapril. Los pacientes que cursen con daño renal deben consultar por el uso de este medicamento con su médico tratante.

Consumo de alcohol:

Debe evitar el consumo de alcohol mientras se encuentre en tratamiento con Enalapril, ya que, puede provocar un incremento en el efecto de la droga, o causar mareos y debilidad.

Manejo de vehículos: Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

Embarazo:

Este medicamento puede causar daño al feto, su uso durante el embarazo está contraindicado. Si usted está embarazada debe advertírselo a su médico.

Lactancia:

Este medicamento pasa a la leche materna y puede dañar al bebé.

Lactantes y niños:

No se recomienda su utilización en niños, a menos que su pediatra así lo señale.

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
SUBDEPTO. REGISTRO
UNIDAD PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES

02 MAR 2012

N° Ref: RF302679/11
N° Registro: F-19260/12
Firma Profesional: Cca

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ENALAPRIL MALEATO COMPRIMIDOS 20 mg

Precauciones especiales:

Para evitar el riesgo de una caída brusca de su presión arterial, se recomienda iniciar el tratamiento con la dosis más baja; según indique su médico, y tomarlo de preferencia en la noche, sobre todo en pacientes ancianos.

Aunque la presión arterial esté controlada y se sienta bien no debe dejar de tomar el Medicamento sin consultar a su médico.

Usted debe visitar periódicamente a su médico, para evaluar su presión y tratamiento.

No interrumpa el tratamiento sin consultar a su médico.

Antes de hacerse algún tipo de cirugía, ya sea dental o de otro tipo debe decirle al médico a cargo o dentista que está en tratamiento con este medicamento.

CONTRAINDICACIONES

Si ha presentado síntomas de alergia al Enalapril, benazepril, cilazapril, espirapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril y trandolapril. Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

INTERACCIONES

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Usted debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco.

Medicamentos:

En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: Suplementos de potasio, Warfarina, Alopurinol, Glibenclamida, Acido acetilsalicílico y otros analgésicos y antiinflamatorios, Clozapina, Ciclosporina, Furosemida, Hidroclorotiazida, Probenecid, Rifampicina y sales de litio.

Enfermedades:

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus, estenosis arterial renal.

Alimentos:

Debe evitar consumir alimentos que contengan mucho potasio.

Exámenes de laboratorio:

Antes de practicarse algún examen de sangre y /o de orina debe avisar al médico a cargo que está en tratamiento con este medicamento.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados)

Los medicamentos pueden producir efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: fiebre y escalofríos, dolor de garganta y ronquera, súbita dificultad para respirar, inflamación de la cara, boca o extremidades, fiebre, escalofríos, confusión, coloración amarillenta de piel u ojos, picazón intensa, dolor en el pecho o palpitaciones, dolor abdominal.



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ENALAPRIL MALEATO COMPRIMIDOS 20 mg

Otros efectos:

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: tos seca y persistente, mareos y dolores de cabeza, alteración en el gusto.

DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Use este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia que la que su médico indique.

El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiado de tratamiento en su caso en particular, no obstante la dosis usual es:

Al inicio del tratamiento 2,5 a 5 mg una vez al día, según prescripción médica, la dosis usual está en el rango de 10 – 40 mg una vez al día o repartida en dos dosis diarias.

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca la dosis inicial es 2,5 mg dos veces al día, la dosis usual oscila en el rango de los 2,5 – 20 mg dos veces al día. La dosis máxima diaria es de 40 mg en ambos casos.

Consejo de cómo Administrarlo

Su médico le indicará la dosis y frecuencia con que este medicamento debe ser consumido según la patología que usted presente. No tome más medicamento ni con más frecuencia que el que su médico le indica.

Este medicamento lo puede consumir con o sin comida.

Si olvida tomar una dosis de su medicamento, tómelo lo más pronto posible. Si es casi hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y espere hasta entonces para tomar el medicamento.

Uso prolongado.

Debe mantener un constante control médico, además de una revisión regular de la presión arterial.

SOBREDOSIS

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: mareos, frío, calambres. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 25 °C.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

No repita el tratamiento sin indicación médica

No recomiende este medicamento a otra persona.

No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

