

DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

DOMPERIDONA
Comprimidos
10 mg

*Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o **químico** farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.*

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Domperidona 10 mg

Excipientes: Lactosa monohidrato, Almidón de maíz, Colorante ~~lila~~ **FD&C N° 1 azul brillante**, Benzoato de sodio, Gelatina, Estearato de magnesio, c.s

Envase con X cápsulas.

CLASIFICACIÓN:

Antiemético

INDICACIONES:

~~Este medicamento está indicado en el tratamiento sintomático de náuseas y vómitos en los siguientes casos: reflujo gastroesofágico después de las comidas, dispepsia por dificultad del vaciamiento gástrico, vómitos en estados infecciosos, uso en pediatría en regurgitación post-prandial, estudios radiológicos o endoscópicos y afecciones hepatodigestivas.~~

Alivio de síntomas como náuseas, vómito, sensación de ardor en el estomago.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con este medicamento, ya que el alcohol puede empeorar los síntomas de su enfermedad.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas somnolencia, mareos y / o disminuir sus capacidades mentales y reflejos para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo


Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

La dosis en niños menores de 7 años debe ser indicada por su pediatra.



DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

- Precauciones especiales

Se pueden producir síntomas de sobredosis con dosis normales sobre todo en niños y adolescentes y también con dosis altas como las empleadas en la prevención y tratamiento de vómitos inducidos por quimioterapia.

CONTRAINDICACIONES:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

En el caso de que padezca de hemorragia digestiva, perforación u obstrucción intestinal o feocromocitoma.

INTERACCIONES:

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente sales de litio, analgésicos, clorfenamina, alprazolam, digoxina, levodopa, antiácidos, antiespasmódicos, espasmolíticos.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de asma, hemorragia abdominal,

enfermedad de Parkinson, epilepsia, porfiria, obstrucción intestinal, feocromocitoma .

EFFECTOS ADVERSOS (*no deseados*):

Generalmente es bien tolerado

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: rush, urticaria, calambres abdominales dificultad para hablar o tragar, mareos, latidos cardiacos irregular o rápido, fiebre, debilidad, hipertensión, temblor, movimientos incontrolados de brazos y piernas.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea, somnolencia, estreñimiento, irritabilidad.

SOBREDOSIS:

Se pueden presentar síntomas como somnolencia, temblor, hipertensión, mareos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Administración vía oral.

DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

~~El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:~~

- Rango y frecuencia

La dosis usualmente recomendada para adultos ~~en el manejo de náuseas y vómitos en adultos~~
es de (10 a 20 mg). 1 o 2 comprimidos cada 8 horas.

~~La dosis pediátrica para 200-400 microgramos/Kg. De peso cada 4 a 8 horas.~~

Niños de 7 a 12 años 1 comprimido 3 veces al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo 15 a 20 minutos antes de las comidas.

- Uso prolongado

Si los síntomas persisten luego de 5 días debe consultar con su médico, ya que Domperidona puede estar ocultando una enfermedad más grave.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantenga en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 25°C.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Reg ISP N°

BIBLIOGRAFÍA:

www.drugs.com

www.rxlist.com

www.uspdi.micromedex.com