

CON FECHA 30-7-2012

DOMPERIDONA
CAMBIA CONDICIÓN
DE VENTA.
Res 001924

PHARMA
Genexx 

DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO

ENVASE VENTA: Envase Secundario - Texto Estuche

DOMPERIDONA ✓
Comprimidos ✓
.10 mg ✓

LOGO ✓

Contenido: X cápsulas comprimidos

Vía de Administración: Oral ✓

Composición:

Domperidona

10 mg ✓

Excipientes: Lactosa monohidrato, Almidón de maíz, Colorante FD&C azul N° 1 brillante,
Benzoato de sodio, Gelatina, Estearato de magnesio c.s

Posología:

~~Según indicación médica.~~

Dosis adultos: 1 a 2 comprimidos cada 8 horas. } ~~eliminar~~

Dosis niños 7 a 12 años 1 a 2 comprimidos cada 8 horas. }

Modo de uso:

Tomar los comprimidos 15 a 20 minutos antes de las comidas. } ~~eliminar~~

Indicación:

Alivio de síntomas como náuseas, vómitos y sensación de dolor en el estomago. -> ~~eliminar~~

Duración del Tratamiento:


Si los síntomas persisten más de 5 días, consultar con su medico. -> ~~eliminar~~

Venta ~~bajo receta médica~~ directa en establecimientos tipo A y B. CAMBIO 30-7-2012.

Advertencias:

No utilizar con antiácidos, cimetidina, anticolinergicos. -> ~~eliminar~~

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a una temperatura no mayor a 25° C,
protegido de la luz, calor y humedad.



DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a la Domperidona.
- Hemorragia gastrointestinal.
- Tumor hipofisiario producto de prolactina.
- Embarazo y lactancia.

eliminado

Serie:

Vence:

Reg. I.S.P. N°:



Fabricado en Cadila Pharmaceuticals Ltd., Gujarat State, India. Importado por Pharma Genexx,
Camino a Melipilla 7073, Cerrillos, Stgo. Distribuido por Droguería del Laboratorio Volta.
Caupolicán 9291, Bodegas D y E, Quilicura – Santiago.

DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO

ENVASE VENTA: Envase Primario - Texto Blister de Aluminio

DOMPERIDONA
Comprimidos
10 mg

LOGO

Serie:
Vence:
Reg. I.S.P. N°:

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	
DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL	
SUBDEPTO REGISTRO	
UNIDAD PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES	
0 8 SEP 2008	
N° Ref.	2119/08
N° Registro	F-17.090/08
Firma Profesional:	

Importado por Pharma Genexx S.A., Fabricado por Cadila Pharm. Ltd., India

DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg


PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO

ENVASE MUESTRA MÉDICA: Envase Primario - Texto Blister de Aluminio

**DOMPERIDONA
Comprimidos
10 mg**

LOGO

Serie:
Vence:
Reg. I.S.P. N°:



Importado por Pharma Genexx S.A., Fabricado por Cadila Pharm. Ltd., India

DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a la Domperidona.
- Hemorragia gastrointestinal.
- Tumor hipofisiario producto de prolactina.
- Embarazo y lactancia.

Serie:

Vence:

Reg. I.S.P. N°:



Fabricado en Cadila Pharmaceuticals Ltd., Gujarat State, India. Importado por Pharma Genexx, Camino a Melipilla 7073, Cerrillos, Stgo. Distribuido por ~~Droguería~~ del Laboratorio Volta. Caupolicán 9291, Bodegas D y E, Quilicura – Santiago.

DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO

ENVASE CLÍNICO: *Envase Primario - Texto Blister de Aluminio*

**DOMPERIDONA
Comprimidos
10 mg**

LOGO

Serie:
Vence:
Reg. I.S.P. N°:



Importado por Pharma Genexx S.A., Fabricado por Cadila Pharm. Ltd., India

DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO

ENVASE CLÍNICO: Envase Secundario - Texto Estuche

DOMPERIDONA
Comprimidos
10 mg

LOGO



Contenido: X cápsulas

Vía de Administración: Oral

Composición:

Domperidona 10 mg

Excipientes: Lactosa monohidrato, Almidón de maíz, Colorante ~~laca~~ FD&C Nº 1 azul brillante,
Benzoato de sodio, Gelatina, Estearato de magnesio c.s

Posología:

~~Según indicación médica.~~

Dosis adultos: 1 a 2 comprimidos cada 8 horas.

Dosis niños 7 a 12 años 1 a 2 comprimidos cada 8 horas.

Modo de uso:

Tomar los comprimidos 15 a 20 minutos antes de las comidas.

Indicación:

Alivio de síntomas como náuseas, vómitos y sensación de dolor en el estomago.

Duración del Tratamiento:

Si los síntomas persisten más de 5 días, consultar con su medico.

~~Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.~~

Envase Clínico solo para establecimientos Médico – Asistenciales.

Advertencias:


No utilizar con antiácidos, cimetidina, anticolinergicos.

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a una temperatura no mayor a 25° C, protegido de la luz, calor y humedad.

DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a la Domperidona.
- Hemorragia gastrointestinal.
- Tumor hipofisiario producto de prolactina.
- Embarazo y lactancia.



Serie:

Vence:

Reg. I.S.P. N°:

Fabricado en Cadila Pharmaceuticals Ltd., Gujarat State, India. Importado por Pharma Genexx, Camino a Melipilla 7073, Cerrillos, Stgo. Distribuido por ~~Droguería del~~ Laboratorio Volta. Caupolicán 9291, Bodegas D y E, Quilicura – Santiago.