

VITANGO

ADAPTÓGENO ANTIESTRÉS

COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto contiene:

Extracto de Rhodiola rosea 200 mg

Excipientes c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

VITANGO es un fitofármaco que previene y reduce el estrés asociado con el trabajo físico y mental excesivo, aliviando síntomas tales como fatiga, agotamiento, irritabilidad y tensión. Vitango evita eficazmente el aumento patológico de las hormonas relacionadas con el estrés como la adrenalina y el cortisol, favoreciendo además la liberación de serotonina, neurotransmisor potenciador del estado de ánimo y de biomarcadores con actividad adaptogénica como el neuropéptido Y.

El inicio de la acción o periodo de latencia de VITANGO comienza después de unos pocos días. VITANGO se debe administrar, por 1 a 2 semanas para obtener los beneficios terapéuticos máximos y debe mantenerse por, a lo menos, 3 meses.

INDICACIONES

VITANGO está indicado para el alivio de los síntomas mentales y físicos del estrés y exceso de trabajo, como fatiga, cansancio, agotamiento, irritabilidad y tensión.

CONTRAINDICACIONES

VITANGO está contraindicado en niños menores de 18 años, en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

PRECAUCIONES

VITANGO debe administrarse cuando los síntomas de estrés, tales como el cansancio y la irritabilidad estén presentes. También se puede administrar cuando se anticipe un período estresante.

Como VITANGO tiene un efecto energizante no se recomienda administrar al final del día.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

Hasta el momento no hay evidencia de interacciones farmacológicas de relevancia clínica.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas con VITANGO son escasas, leves y transitorias. Se han reportado reacciones alérgicas aisladas y niveles bajos de glicemia, pero está en duda su relación causal. Algunas personas pueden sentirse demasiado activadas o agitadas y VITANGO puede interferir con el sueño durante las primeras semanas. Sin embargo, este efecto se minimiza tomando el producto durante la primera mitad del día. En los estudios clínicos, los pacientes tratados con VITANGO, no presentaron somnolencia, trastornos relacionados con la memoria ni adicción farmacológica.

SEGURIDAD

Los estudios toxicológicos con VITANGO indican que la DL_{50} en la rata fue de aproximadamente 3.360 mg/kg, lo cual corresponde a 30 g en un hombre de 70 kg. En consecuencia, la administración de VITANGO 200 mg, 2 veces al día, representa un amplio rango de seguridad.

POSOLOGÍA

La dosis clínica de VITANGO recomendada es de 200-400 mg/día. Se recomienda administrar un comprimido de VITANGO 200 mg antes del desayuno y otro antes del almuerzo, por un periodo mínimo de 3 meses.

PRESENTACIÓN

VITANGO 200 mg se presenta en un envase conteniendo 30 comprimidos recubiertos.