

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**VITAMINAS B1-B6-B12 SOLUCIÓN INYECTABLE**

~~FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE~~
~~VITAMINAS B₁ - B₆ - B₁₂ Solución Inyectable 3 mL~~

Condición de venta: sin receta médica**Clasificación:** ~~suplemento vitamínico~~

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

Composición y presentación:**Principio Activo:** Tiamina Clorhidrato, Piridoxina Clorhidrato, Cianocobalamina**Excipientes:** ~~Metilparabeno sódico, Bisulfito de sodio, Bicarbonato de sodio, agua para inyectables.~~**Según última formula aprobada en el registro sanitario.****1.- ¿Para qué se usa?**

Este medicamento es utilizado en la prevención y tratamiento de síndromes neuríticos y trastornos metabólicos producidos por un déficit de vitaminas B1, B6 y B12.

2.- Administración**Oral:**

- Rango y frecuencia

Estos son los requerimientos diarios de vitaminas B1, B6 y B12:

- Recién nacidos a 3 años: 0,4 mg B1 + 0,3 a 1 mg B6 + 0,3 a 0,7 mcg B12
- Niños de 4 a 6 años: 0,9 mg B1 + 1,1 mg B6 + 1 mcg B12.
- Niños de 7 a 10 años: 1 mg B1 + 1,4 mg B6 + 1,4 mcg B12.
- Niños de 11 a 14 años:
- Hombres: 1,3 mg B1+ 1,7 a 2 mg B6+ 2 mcg B12.
- Mujeres: 1,1 mg de B1 + 1,4 a 1,6 mg B6 + 2 mcg B12.
 - Personas de 15 años en adelante:
- Hombres 1,5 mg B + 1,7 a 2 mg B6+ mcg B12.
- Mujeres 1,1 mg de B1 + 1,4 a 1,6 mg B6 + 2 mcg B12.
 - Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia: 1,5 a 1,6 mg de B1 + 2,2 mg B6 + 2,2 mcg B12.

- Consejo de cómo administrarlo

Puede tomarlo junto con las comidas o entre las comidas.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

Inyectable:

Dosis ataque : 1 ampolla 1 a 2 veces al día

Dosis mantención : 1 ampolla 2 - 3 veces por semana

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
 DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL
 SUBDIRECCIÓN REGISTRO
 UNIDAD DE MODIFICACIONES

04 OCT 2011

N° Rol: MT243259/11

N° Registro: F-7969/06

Firma Profesional: [Firma]

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**VITAMINAS B1-B6-B12 SOLUCIÓN INYECTABLE****3.- Precauciones**

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se puede ver disminuida la absorción del medicamento.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento puede ser recomendado por su médico durante el embarazo, sólo debe tomarlo en las dosis indicadas por su médico ya que dosis superiores puede causar efectos adversos no deseados tanto en la madre como en el feto.

- Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. No existen recomendaciones especiales para el uso de este medicamento en niños.

- Precauciones especiales

Para evitar una deficiencia de vitaminas debe consumir una dieta balanceada, vitamina B puede encontrarse en alimentos como vegetales de hojas verdes, maíz, huevos, arroz, legumbres, carne de cerdo, nueces.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a Vitamina B1 (tiamina), B6 (piridoxina) y / o B12 (cianocobalamina).

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente colchicina, ácido fólico, antibióticos, analgésicos, isoniazida, etionamida, hidralazina, panícilamina, inmunosupresores y estrógenos.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de cirrosis, mala absorción intestinal.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, fiebre, picazón, rash, inflamación de labios, boca, garganta o lengua, entumecimiento de los pies.

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**VITAMINAS B1-B6-B12 SOLUCIÓN INYECTABLE****- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea, picazón.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: entumecimiento de los pies, pérdida de la destreza manual, inestabilidad para caminar.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**