


Amoxicilina + Acido Clavulánico 500/125 comprimidos recubiertos
500/125 mg**FOLLETO DE INFORMACION PARA EL PACIENTE**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico-farmacéutico. Guarde e nuevamente.

**COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:**

Cada comprimido recubierto contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato)

500 mg

Ácido Clavulánico (como Clavulanato de potasio)

125 mg

Excipientes c.s.: Celulosa Microcristalina, Lauril sulfato de sodio, Dióxido de silicio coloidal, Almidón glicolato de sodio, Croscarmelosa sódica, Estearato de magnesio, ~~Hidroxipropilmetilcelulosa~~ Hipromelosa, Dióxido de titanio, Talco purificado, ~~Poliethylenglicol 6000~~ Macrogol 6000

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, tracto urinario, de piel y tejidos blandos, sepsis intraabdominal, osteomielitis, producidos por microorganismos sensibles y productores de beta lactamasas demostrado por antibiograma.

DOSIFICACIÓN

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos y niños de 40 Kg o más: 1 comprimido 2 veces al día para infecciones leves o moderadas.

Para infecciones del tracto respiratorio bajo, infecciones del tracto urinario complicadas o infecciones severas en otros sitios 1 - 2 comprimidos 3 veces al día.

Dosificación en falla renal: el ajuste de dosis debe realizarse de acuerdo al nivel máximo recomendado de amoxicilina para adultos y niños.

Dosificación en falla hepática: monitorear la función hepática en intervalos regulares para adultos y niños.

Dosificación en ancianos: no se necesita ajustar la dosis.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Este medicamento se toma generalmente con comidas o bocadillos. Para ayudarle a acordarse de tomar el medicamento, tómelo a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta y pregúntele a su médico o farmacéutico cualquier cosa que no entienda.

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**

**Amoxicilina + Acido Clavulánico 500/125 comprimidos recubiertos
500/125 mg****FOLLETO DE INFORMACION PARA EL PACIENTE**

Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su médico.

Tome el medicamento hasta que finalice la prescripción y a pesar que se sienta mejor. La suspensión del medicamento antes de finalizar la prescripción puede provocar que las bacterias se tomen resistentes a los antibióticos.

A menos que su médico le diga de otro modo, siga con su régimen de alimentación normal mientras toma este medicamento.

Si se olvida de tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, sátese aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con historia de hipersensibilidad (alergia) a los beta-Lactámicos, ej. Penicilinas y cefalosporinas.

Pacientes con historia previa de ictericia o disfunción hepática asociada a amoxicilina.

PRECAUCIONES

Dígale a su médico si usted es alérgico a la amoxicilina, ácido clavulánico, penicilina, cefalosporinas o a otros medicamentos.

Dígale a su médico qué medicamentos con o sin prescripción está tomando, por ejemplo vitaminas, suplementos nutricionales y productos fabricados a base de hierbas. Asegúrese de mencionar los siguientes: alopurinol y probenecid. Su médico podría cambiar la dosis de su medicamento o vigilarle cuidadosamente para evitar el desarrollo de complicaciones relacionadas con efectos secundarios.

Dígale a su médico si tiene o alguna vez ha tenido enfermedades al riñón o hígado, alergias, asma, fiebre del heno, urticarias o mononucleosis.

La amoxicilina y ácido clavulánico pueden reducir la eficacia de los anticonceptivos orales (Píldoras anticonceptivas). Utilice otra forma de prevención del embarazo mientras toma este medicamento.

Dígale a su médico si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame a su médico de inmediato.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA

Estudios de reproducción en animales con administración oral y parenteral no han mostrado efectos teratogénicos. Sin embargo, el uso de este medicamento en embarazadas debe ser evaluado por el médico tratante.

Amoxicilina más Ácido Clavulánico puede ser administrado durante la lactancia, ya que con excepción del riesgo de sensibilización, no hay efectos negativos sobre los lactantes.

**Amoxicilina + Acido Clavulánico 500/125 comprimidos recubiertos
500/125 mg****FOLLETO DE INFORMACION PARA EL PACIENTE****EFFECTOS ADVERSOS**

Dígale a su médico si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece:

- diarrea
- malestar estomacal
- vómitos
- sarpullido leve (erupciones en la piel)

Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato:

- sarpullido severo
- prurito (picazón)
- urticarias
- dificultad para respirar o tragar
- resoplo (respiración con silbido inusual)
- picazón y descarga vaginal
- decoloración amarillenta de la piel u ojos

Este medicamento puede provocar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene cualquier problema extraño mientras toma este medicamento.

SOBREDOSIFICACIÓN

Los síntomas de la sobredosis son:

- dolor de estómago
- vómitos
- diarrea
- sarpullido
- hiperactividad
- somnolencia (sueño)

El tratamiento debe ser sintomático, con especial atención en el balance agua / electrolitos.

Este medicamento puede ser removido por hemodiálisis.

ALMACENAMIENTO

Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Almacénelo a temperatura ambiente **a no más de 25°C** y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el baño).

Deseche cualquier medicamento que esté vencido o que ya no se utilice. No congele los medicamentos.

FOLLETO DE INFORMACION**PHARMA GENEXX S.A. PACIENTE**

Página 3 de 4

**Amoxicilina + Acido Clavulánico 500/125 comprimidos recubiertos
500/125 mg**

FOLLETO DE INFORMACION PARA EL PACIENTE

**NO USAR ESTE PRODUCTO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
INDICADA EN SU ENVASE**

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES A SU MÉDICO.

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**