

# BETINA

## Diclorhidrato Comprimidos 16 mg

**BIOEQUIVALENTE**

**Eurofarma Chile S.A.**

### ***FÓRMULA FARMACÉUTICA Y COMPOSICIÓN.***

| <b>Cada comprimido contiene:</b>       |          |
|----------------------------------------|----------|
| Betahistina como Diclorhidrato         | 16,0 mg. |
| Excipientes: Los aprobados en registro |          |

### ***INDICACIONES TERAPÉUTICAS.***

#### **Antivertiginoso.**

Indicado en desórdenes patológicos por déficit microcirculatorio en el laberinto: vértigo, tinitus, pérdida de la audición asociada al Síndrome de Menière y condiciones vertiginosas correlacionadas.

### ***CONTRAINDICACIONES.***

#### **No usar en los siguientes casos:**

Betahistina diclorhidrato no debe ser utilizado en los siguientes casos: alergia a Betahistina o alguno de los componentes de la formulación, úlceras activas de estómago y de duodeno, o que se manifiesten durante el tratamiento. Pacientes que sufran de feocromocitoma. En los pacientes asmáticos, el uso de Betahistina diclorhidrato exige un acompañamiento cuidadoso del médico.

#### **No usar en pacientes hipertensos sin indicación del médico.**

### ***ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.***

Informe a su médico si sospecha u ocurre embarazo durante el tratamiento o después del término de este. Informe igualmente si está amamantando. En estos casos, solamente su

médico puede determinar si usted debe continuar con el tratamiento con Betahistina diclorhidrato. No es recomendado el uso de Betahistina durante la gestación y la lactancia. No han sido descritas, hasta el momento, alteraciones en la fertilidad y/o potencial carcinogénico. No interrumpa el tratamiento sin el consentimiento de su médico. El tratamiento con Betahistina diclorhidrato puede durar meses, de forma continua o discontinua.

En los pacientes asmáticos la administración de Betahistina diclorhidrato exige un acompañamiento cuidadoso debido al riesgo de ocurrir broncoconstricción.

Betahistina debe ser usado con precaución en las siguientes condiciones clínicas: Asma bronquial, historia de úlcera péptica.

**Siga las indicaciones de su médico, respetando siempre los horarios, las dosis y la duración del tratamiento.**

**No interrumpa el tratamiento sin el conocimiento de su médico.**

**No use este producto después de la fecha de vencimiento en el envase.**

**No repita el tratamiento sin antes consultar con su médico.**

**No recomiende este medicamento a otra persona.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

### ***PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA.***

Betahistina diclorhidrato no debe ser usado durante el embarazo y la lactancia.

### ***EFFECTOS ADVERSOS (no deseados).***

Informe a su médico la aparición de reacciones desagradables.

Las reacciones más frecuentes son dolores de estómago, náuseas y vómitos. Usted debe tener cuidado especial cuando haya sufrido úlcera péptica. Muy raramente pueden ocurrir reacciones como dolor de cabeza y somnolencia.

### ***INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.***

Informe a su médico sobre cualquier medicamento que esté usando, antes del inicio y durante el tratamiento, incluso aquellos sin receta médica.

Betahistina diclorhidrato no debe ser administrado con medicamentos que contengan atropina y/o histamina. Cualquier medicamento debe ser usado bajo la supervisión y cuidado del su médico. No usar junto con antialérgicos (antihistamínicos).

## **DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN.**

***El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:***

3 comprimidos de 8 mg, (24mg/día, divididos en tres tomas al día, de preferencia durante las comidas.

En función de los resultados obtenidos la dosis puede ser aumentada a tres comprimidos de 16mg y seis comprimidos de 8mg, dos comprimidos de 24mg, en dosis divididas durante el día. La dosis máxima es de 48 mg/día.

**Duración del tratamiento:** La duración recomendada del tratamiento es de 2 a 3 meses a ser repetido de acuerdo con la evaluación de la sintomatología. La Betahistina no es indicada para un tratamiento de crisis, más bien para un tratamiento prolongado, a ser mantenido o interrumpido de acuerdo con la evaluación de la enfermedad.

La dosis y cuidados de los pacientes ancianos son las mismas recomendadas para los adultos. Tome los comprimidos con un poco de agua, junto con las comidas. Tome siempre el comprimido en un horario previsto, cuando olvide una dosis, no tome dos comprimidos de una sola vez para evitar dolores estomacales.

Siga la orientación de su médico, respetando siempre los horarios, y las dosis y la duración del tratamiento.

## **SOBREDOSIFICACIÓN.**

La sintomatología es análoga es provocada por la Betahistina. Administrar antihistamínicos. En caso de ingerir accidentalmente una sobredosis, promover el lavado gástrico y si es necesario, usar expansores plasmáticos y soluciones salinas para equilibrar la circulación.

## **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.**

Mantener en su envase original, a una temperatura ambiente (entre 15 y 30°C) y protegidos de la humedad.

## **PRESENTACIÓN.**

Estuche con X Comprimidos de Betina Diclorhidrato 16 mg.