

FICHA TÉCNICA MUPAX UNGÜENTO TOPICO 2%	
NOMBRE DISTRIBUIDOR:	LABORATORIOS RAFFO S.A.
RUT:	96.617.060-3
NOMBRE DEL PRODUCTO:	MUPAX UNGÜENTO TOPICO 2%
NOMBRE DEL PRINCIPIO ACTIVO:	MUPIROCINA
COD INTERNO PROVEEDOR Y UNIDAD EMPAQUE:	1006004
Nº REGISTRO ISP:	F-22854/16
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LABORATORIO DR. LAZAR Y CIA. Q e I.
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE DE PRODUCTO TERMINADO:	Av. Vélez Sársfield 5853 / 5855 Munro, Buenos Aires, Argentina.
ORIGEN DEL PRODUCTO TERMINADO:	Argentina
NOMBRE DEL FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO (MATERIA PRIMA):	Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co. Ltd. - China.
PRODUCTO BIOEQUIVALENTE:	No aplica
PERIODO DE VIGENCIA:	24 MESES
CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:	A no más de 30 °C
CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:	Antibiótico para uso tópico. D06A X09
MECANISMO ACCIÓN:	La Mupirocina es bacteriostática en bajas concentraciones y bactericida a altas concentraciones. Este agente se une en forma específica y reversible a la isoleucina transferasa ARN sintetasa bacteriana, inhibiendo la síntesis de ARN y proteínas en la bacteria. La síntesis de ADN y la formación de la pared celular son afectadas en menor grado.
INDICACIÓN:	Mupax esta indicada para el tratamiento tópico de infecciones de la piel debida a patógenos susceptibles, ya sean infecciones primarias o secundarias. piodermas primarias, tales como: impétigo, foliculitis, furunculosis, ectima. -dermatosis secundaria infectadas, tales como: eczema, psoriasis, dermatitis atópica, herpes, epidermosis ampollar, ictiosis. -lesiones traumáticas infectadas tales como: úlceras, quemaduras pequeñas, cortaduras, abrasiones, laceraciones, heridas sitios de biopsia, incisiones quirúrgicas y picaduras de insectos. -Mupax puede ser usada profilácticamente para prevenir contaminaciones bacterianas en quemaduras menores y en heridas. El uso profiláctico de mupirocina puede prevenir el desarrollo de infecciones y permitir que sane mas rápidamente una herida.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:	Tópico
MODO DE USO:	Adultos y niños (niños de un año o más) Una aplicación 2-3 veces al día durante 5-10 días, dependiendo de la respuesta. Si tras 3-5 días de tratamiento con mupirocina no se aprecia mejoría se debe reconsiderar el diagnóstico y/o el tratamiento. La superficie tratada puede ser cubierta con una gasa a modo de oclusión. En niños menores de un año no hay estudios suficientes, no usar. Ancianos: No es necesario efectuar un ajuste posológico a menos que exista riesgo de absorción sistémica de polietilenglicol y haya evidencia de insuficiencia renal moderada o grave.
PRESENTACIÓN:	Estuche que contiene pomo con tapa de 7,5 g.
UNIDAD DE VENTA (EAN13)	
CÓDIGO UNIDAD DE VENTA EAN13:	7795347982890
TIPO DE ENVASE:	Estuche
UNIDADES POR ENVASE:	1 pomo x 7,5gr
ALTO (CM)	3
ANCHO (CM)	2,2
FONDO (CM)	10,6
PESO BRUTO GRAMOS	15,6
UNIDAD DE DESPACHO (DUN14)	
CÓDIGO UNIDAD DE DESPACHO DUN14:	7809531200889
TIPO DE ENVASE:	Caja
UNIDADES POR ENVASE:	50 estuches
ALTO (CM)	20
ANCHO (CM)	13
FONDO (CM)	20
PESO BRUTO GRAMOS	800