



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
BROMHEXINA CLORHIDRATO
JARABE 4 mg/ 5 mL



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada 5 mL de jarabe contiene:
Bromhexina clorhidrato 4 mg
Excipientes: Metilparabeno, Sacarosa, Esencia de Frambuesa, Ácido Cítrico Anhidro, Agua Purificada, Hidróxido de Sodio, Ácido Clorhídrico.

Clasificación:

Mucolítico y expectorante.

Indicaciones:

Alivio de la tos productiva (con secreción o flema). No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, asma, enfisema o en la tos seca.

Advertencias:

Si la tos persiste por más de 7 días consulte a su Médico.

Contraindicaciones:

Está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad a Bromhexina, Ambroxol, o a cualquier componente de la formulación.
No administrar durante el embarazo, ni durante la lactancia.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). No es recomendable la administración de este medicamento con otros que disminuyan las secreciones bronquiales, como Atropina.

Efectos Indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: náuseas, dolor epigástrico, y vómitos. Estos efectos son raramente severos como para discontinuar la terapia. En raros casos: dolor de cabeza, mareos, transpiración excesiva y reacciones alérgicas.

Precauciones:

Úsese con precaución en pacientes con historial de úlcera péptica, asma, pacientes con antecedentes de enfermedad neurológica. Este producto contiene Sacarosa, precaución en pacientes diabéticos.

Dosis:

Adultos y niños mayores de 10 años: 10 mL (2 cucharaditas) cada 8 horas.
Niños de 6 - 10 años: 5 mL (1 cucharadita) cada 8 horas
Niños de 2 - 6 años: 2,5 mL cada 8 horas.

Sobredosis:

Acuda a un Centro Asistencial. Como medidas generales se deben realizar de inmediato vaciamiento gástrico ya sea a través de inducción de vómito o por lavado gástrico. Aplicar medidas de soporte general e iniciar el tratamiento sintomático.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

V5
730446
19.05.14