



AMLODIPINO COMPRIMIDOS 5 MG

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada comprimido contiene: Amlodipino (como besilato) 5 mg.

Excipientes: Lauril Sulfato de Sodio, Croscarmelosa Sódica, Dióxido de Silicio Coloidal, Calcio Fosfato Dibásico Dihidrato Estearato de Magnesio, Lactosa Monohidrato, Celulosa Microcristalina.

CLASIFICACIÓN:

Antihipertensivo. Antianginoso.

INDICACIÓN:

Tratamiento de la hipertensión arterial, angina crónica estable y angina Prinzmetal.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

ÚSESE SÓLO POR INDICACIÓN Y BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA.

- Administrar con precaución en pacientes con enfermedad cardíaca congestiva, estenosis aortica, insuficiencia hepática
- Si se va a someter a una cirugía incluyendo cirugía dental informe a su médico que está en tratamiento con este medicamento.
- La suspensión de la terapia con Amlodipino debe realizarse en forma gradual.
- Este comprimido no debe ser fraccionado.

CONTRAINDICACIONES:

Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos: Pacientes con hipotensión severa. Embarazo y lactancia. Alergia a Amlodipino. Pacientes con riesgo de hiperplasia gingival.

INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar al médico o farmacéutico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, especialmente: Anestésicos, estrógenos, litio. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso de que se someta a algún examen.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al médico si algunos de estos síntomas ocurren: Hinchazón de pies y tobillos, mareos, palpitaciones, angina o dolor en el pecho, bradicardia, hipotensión, orina de color amarillo oscuro, ojos o piel de color amarillo, sensación de mareo al ponerse de pie después de estar sentado o acostado.



AMLODIPINO COMPRIMIDOS 5 MG

DOSIS:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 2.5 - 10 mg 1 vez al día. En caso de olvido de una dosis, tómela lo antes posible. Sin embargo, si ya está muy cerca de la siguiente dosis sáltese la dosis olvidada. Nunca duplique la dosis.

SOBREDOSIS:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un centro de atención médico.