



AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDOS

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada Comprimido contiene:
Azitromicina dihidrato 500 mg
Excipientes: c.s

CLASIFICACIÓN:

Antibiótico.

INDICACIÓN:

Infecciones causadas por organismos susceptibles, infecciones del tracto respiratorio inferior y superior (bronquitis, neumonía, sinusitis, faringo/amigdalitis). Infecciones de la piel, tejidos blandos y otitis media. Enfermedades de transmisión sexual e infecciones genitales no complicadas debidas a Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae no multirresistente.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

ÚSESE SÓLO POR INDICACIÓN Y BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA.

- Si los síntomas no mejoran dentro de algunos días o si llegan a empeorar, consulte al médico.
- Tome azitromicina hasta finalizar el tratamiento, aunque se sienta mejor a los pocos días.

CONTRAINDICACIONES:

No usar este medicamento en los siguientes casos:

- Usar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal.
- En pacientes con alergia a azitromicina o cualquier antibiótico macrólido o a algún otro componente de la formulación

INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (Interacciones). Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco.

- Antiácidos que contienen aluminio y/o magnesio. Pueden disminuir la concentración de azitromicina en la sangre
- Derivados del Ergot.
- Ciclosporinas. Su metabolismo es interferido por azitromicina.
- Digoxina, puede aumentar los niveles plasmáticos de digoxina.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Raro: dolor o calambres estomacales o abdominales (severo),



AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDOS

molestia abdominal, diarrea (acuosa y severa la cual puede ser con sangre), dificultad al respirar, fiebre, dolor en las articulaciones, rash cutáneo, hinchazón de cara , boca, cuello, manos y pies.

DOSIS:

La dosis indicada por el médico debería tomar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas, ya que al administrarse con alimentos disminuye su biodisponibilidad

SOBREDOSIS:

En caso de ingestión accidentales deben tomar las medidas de soporte generales.
Conduzca al intoxicado a un centro de atención medico hospitalario.