



## FICHA TÉCNICA

**Nombre presentación:** Ricilina Forte suspensión oral

**Laboratorio:** Recalcine

**Principio Activo:** Azitromicina

**Acción terapéutica:** Antibiótico

**Indicaciones:** Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo y superior, del tracto urinario, piel y tejidos blandos causados por microorganismos sensibles, demostrado por antibiograma.

**Contraindicaciones:**

No usar en los siguientes casos:

Antecedente de hipersensibilidad (reacción alérgica) a la azitromicina, a la eritromicina o a otro antibiótico macrólido, así como a cualquier componente de la fórmula

**Reacciones adversas:**

Incidencia rara: Fiebre; dolor de las articulaciones; rash cutáneo; inflamación de la cara; cuello, boca, manos y pies; dificultad respiratoria; calambres abdominales o dolor de estómago severo; sensibilidad abdominal; diarrea severa, acuosa y a veces sanguinolenta.

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos adversos que normalmente no requieren atención médica, a menos que sean demasiado molestos o no desaparezcan durante el curso del tratamiento:

Incidencia menos frecuente: Molestias gastrointestinales, tales como dolor abdominal, diarrea leve, náuseas y vómitos.

Incidencia rara: Dolor de cabeza y mareos.

Consulte a su médico si ocurre cualquier efecto adverso que no haya sido mencionado anteriormente.

**Dosificación y Administración:** El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

Dosis niños mayores de 2 años:

Infecciones respiratorias, otitis media y neumonía, la dosis es de 10 mg/kg de peso el primer día (sin sobrepasar los 500 mg), seguido de 5 mg/Kg de peso al día en los días 2 a 5 (sin sobrepasar los 250 mg/día)

Faringitis o tonsilitis causada por *Streptococcus pyogenes*: 12mg/kg de peso al día por 5 días (sin sobrepasar los 500 mg diarios).

Niños menores de 2 años de edad: No se recomienda su uso, ya que la seguridad y eficacia de este medicamento no han sido establecidos en este grupo de pacientes.

**Sobredosis:** Cualquier medicamento utilizado en exceso puede ocasionar serias consecuencias. Si Ud. sospecha que ha ocurrido una posible sobredosis, solicite atención médica inmediatamente.

**Composición:** Cada 5 ml de suspensión reconstituida contiene: Azitromicina (como dihidrato) 400 mg; Excipientes: goma xantana, esencia de plátano, esencia de tutti-frutti, esencia toffee, colorante FD y C rojo N°40, fosfato trisódico dodecahidrato, ácido cítrico anhidro, metilparabeno sódico, propilparabeno sódico, agua purificada, sacarosa.

**Presentación:** 30 ml de suspensión reconstituida

**Similares en el mercado:** Trex, Azitrom

**Índice de Cronicidad:** Agudo