



SAVAL

Valax-D 160/12,5 Valsartan 160 mg Hidroclorotiazida 12,5 mg 30 Comprimidos Recubiertos



Cada comprimido recubierto contiene:

Valsartán 160 mg

Hidroclorotiazida 12,5 mg

Excipientes: lactosa monohidrato, lauril sulfato de sodio, povidona K-30, crospovidona, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, colorante FD&C rojo N°40 en laca aluminica, benenato de glicerilo, hipromelosa, macrogol, dióxido de titanio, colorante FD&C azul N°2 en laca aluminica, celulosa microcristalina c.s.

Uso oral.

No dejar al alcance de los niños.

No administrar durante el embarazo.

Venta bajo receta médica.

Almacenar a no más de 30°C.

Otras informaciones: ver folleto adjunto.

CHILE: Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A. Mayor información en www.savai.cl y www.ispch.cl.

DT. Claudio Barrios. Reg. I.S.P. N° F-17383.

BOLIVIA: Importado y distribuido por Farmaval Bolivia S.R.L., Av. Beni entre 4to y 5to anillo Urb. Canada Dry, C/ Maria Luisa Castro N° 28, Santa Cruz - Bolivia. QF. Katerin Gallardo. Reg. II-64376/2018.

COSTA RICA: Reg. M-CL-15-00452.

GUATEMALA: Reg. PF-52476.

HAÍTÍ: Reg. 8-0213.

REP. DOMINICANA: Titular Laboratorios Savai S.A. Chile. Reg. PRS-ME-2018-0307. ® Marca Registrada



Valax-D 160/12,5 Valsartan 160 mg Hidroclorotiazida 12,5 mg 30 Comprimidos Recubiertos

Valsartán/Hidroclorotiazida se usa para tratar la presión arterial alta que no se controla adecuadamente con el uso de un único componente. La hipertensión aumenta la carga del corazón y de las arterias. Antihipertensivo aditivo: asociación de un antagonista de angiotensina II (Valsartán) y un diurético (hidroclorotiazida). Si no se trata, puede dañar los vasos sanguíneos del cerebro, corazón y riñones y puede provocar un infarto cerebral, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. La presión arterial alta aumenta el riesgo de ataques cardíacos.

Beneficios

La disminución de la presión arterial a valores normales reduce el riesgo de desarrollar estos trastornos.

Principales principios activos

- Valsartan 160 mg.

Modo de uso

La administración de Valsartán a enfermos hipertensos reduce la presión arterial sin modificar la frecuencia cardíaca. En la mayoría de pacientes, tras la administración de una dosis oral única, el inicio de la actividad antihipertensiva tiene lugar en las primeras 2 horas, y la reducción máxima de la presión arterial se alcanza en 4-6 horas. El efecto antihipertensivo persiste durante 24 horas después de la dosis. Cuando se administran dosis repetidas, la reducción máxima de la presión arterial suele ocurrir entre la 2-4 semana con todas las dosis y se mantiene durante el tratamiento prolongado. Si se añade hidroclorotiazida, se observa una reducción adicional y significativa de la presión arterial.