

Gelacne Adapaleno/Peroxido De Benzoilo 0,1 Gel Tópico 30 gr











Gelacne Adapaleno/Peróxido De Benzoílo 0,1 Gel Tópico 30 gr

Tratamiento cutáneo del acné vulgar en presencia de comedones, pápulas y pústulas. Está indicado en adultos, adolescentes y niños a partir de 9 años.

Principio Activo

Adapaleno, Peróxido de Benzoilo.

Clase Terapéutica

Antiacneico de uso tópico.

Forma Farmacéutica

Gel tópico

Contenido

Pomo de 30 g. de gel

Composición

Cada 100 g contiene: Adapaleno 0.10 g; Peróxido de Benzoílo 2.50 g. Excipientes: Propilenglicol; Glicerol; Dioctilsulfosuccinato de Sodio; Poloxamer 188; Edta Disódico; Metilparabeno; Poliacrilato-13/ Poliisobutano/ Polisorbato 20; Polietilenglicol 400; Agua Purificada.

Mecanismo de acción

El Adapaleno es un derivado del ácido naftoico químicamente estable, con actividad similar a la de los retinoides, que modula la diferenciación celular y la queratinización, y tiene propiedades antiinflamatorias (inhibe el componente inflamatorio mediado por células del acné). El Adapaleno se une a receptores nucleares específicos del ácido retinoico, pero, a diferencia de la tretinoína, no se une a la proteína receptora citosólica. El Adapaleno administrado de manera tópica normaliza la diferenciación de las células epiteliales foliculares, disminuyendo la formación de microcomedones.



El Peróxido de Benzoilo tiene una actividad antimicrobiana de amplio espectro, de manera particular contra el P. acnés, presente en la unidad pilosebácea afectada por el acné. Además de poseer acciones exfoliativas y queratolíticas, ambas beneficiosas para el tratamiento del acné, el Peróxido de Benzoilo es también sebostático, contrarrestando la producción excesiva de sebo asociada con el acné.

DESCRIPCIÓN

Beneficios

Primera línea en el manejo del acné. Actúa sobre los cuatro pilares del acné: queratolítico, antiseborreico, antibacteriano y antiinflamatorio. Control y confianza desde el inicio del tratamiento. Óptimas propiedades cosméticas. Mayor accesibilidad gracias a su óptima relación costo-beneficio.

Indicaciones

Tratamiento tópico del acné vulgaris, en presencia de comedones, pápulas y pústulas.

Posología

Aplicar sobre todas las áreas afectadas por el acné una vez por día a la noche, sobre la piel limpia y seca. Se debe aplicar una capa fina de gel con la punta de los dedos, evitando el contacto con los ojos, fosas nasales y labios. El médico determinará la duración del tratamiento en base a la condición clínica del paciente. Los signos tempranos de mejoría clínica generalmente aparecen después de 1 a 4 semanas de tratamiento.

Precauciones de uso

No debe aplicarse GELACNÉ sobre la piel dañada, ya sea piel lastimada (cortes o abrasiones) o eccematosa, o quemada por el sol. Este producto contiene propilenglicol, que puede causar irritación cutánea. Debe evitarse el contacto de GELACNÉ con los ojos, boca, fosas nasales o membranas mucosas. Si el producto entra en contacto con los ojos, se deberá enjuagar inmediatamente con agua tibia. En caso de reacciones que sugieran sensibilidad a algún componente de la fórmula, se deberá discontinuar el uso de GELACNÉ.