

Zincovit Zinc 5 mg / mL Solución Oral 30 mL





ZINCOVIT SOLUCION ORAL PARA GOTAS 5 mg/ml Gotas

Laboratorio: ITF LABOMED FARMACEUTICA

Drogas:

- Zinc

Acciones:

Acciones:

- Cada ml (16 gotas) de solución oral para gotas contiene: Zinc (como sulfato monohidratado) 5 mg. Excipientes c.s.: Sorbitol, Esencia de Frambuesa, Sucralosa, Metilparabeno Sódico, Colorante Rojo Ponceau 4-R, Ácido Cítrico Anhidro, Agua Purificada.
- Suplemento de zinc.
- Profilaxis y tratamiento de los estados carenciales de zinc por escaso aporte o mala absorción intestinal y otras condiciones que interfieren con su utilización o que aumenten su pérdida corporal previa determinación de los niveles plasmáticos de zinc. **Grupo etario lactantes 0-6 meses:** 6 gotas (2 mg/día).
- **Recomendaciones de uso:** *Este medicamento se utiliza cuando el aporte de zinc es insuficiente en la dieta (dietas pobres o insuficientes) o cuando existen estados o enfermedades que hacen necesario administrar zinc, como por ejemplo:* etapa de crecimiento o desarrollo, intervenciones quirúrgicas, alteraciones inmunológicas, infecciones a repetición. **Formas de administración:** Administrar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas, a menos que sea mal tolerado. El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. **No obstante, la dosis usual recomendada es:** *Para la profilaxis (prevención): Niños de 0 a 6 meses de edad:* 6 gotas (2 mg) al día. *Niños de 6 meses a 3 años de edad:* 10 gotas (3 mg) al día. *Niños de 4 a 8 años de edad:* 16 gotas (5 mg) al día. *Niños de 9 a 12 años de edad:* 26 gotas (8 mg) al día. Para el tratamiento del déficit, se debe suministrar de acuerdo a recomendación médica, dependiendo de la severidad del déficit.
- Los medicamentos pueden producir efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica y otros suelen ser pasajeros y desaparecen al ajustar la dosis o acompañarla con alimentos (malestares gástricos).
- No usar en caso de alergia o hipersensibilidad a alguno de los componentes.
- **Importante:** Este es un medicamento. Su uso reporta beneficios, pero también riesgos. No es golosina.
- La administración de este medicamento no es a permanencia. Su uso prolongado debe ser vigilado por un médico. La administración de este medicamento en dosis mayores a las recomendadas o por tiempo prolongado debe ser evaluada periódicamente. Este medicamento no está diseñado para suplir los requerimientos en embarazo o lactancia. No se recomienda su uso, salvo indicación médica.
- **Presencia de otras enfermedades:** El efecto de un medicamento también puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados,



algunos de ellos severos. Ud. debe informar a su médico o farmacéutico de cualquier enfermedad antes de usar este medicamento. **Interacciones:** El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica antes de usar este medicamento. Particularmente si está haciendo uso de medicamentos tales como antibióticos, quelantes de metales (penicilamina, dietilenetriamina pentaacetato), hierro, diuréticos.

- No existe antídoto específico. Se debe trasladar al intoxicado al centro asistencial más cercano para tratamiento sintomático. Lleve con Ud. este folleto.
- Envase conteniendo 30 ml.