

ARTWORK

INFOLEAFLET



FOLLETO DEINFORMACIÓN ALPACIENTE

Trihexifenidilo Clorhidrato Comprimidos 2 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Trihexifenidilo Clorhidrato.....2 mg.

Excipientes: Almidón de maíz, Gelatina, Talco, Estearato de magnesio, Fosfato dicalcico, Dióxido de silicio coloidal, Almidón glicolato sódico.

INDICACIÓN:

Tratamiento de: Parkinsonismo, reacciones extrapiramidales inducidas por fármacos.

CLASIFICACIÓN:

Antidisquinético.

ADVERTENCIAS:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Puede producir somnolencia. Deberá evitarse la ingesta de bebidas alcohólicas. Tomar el medicamento con alimentos (después de las comidas) para aliviar la irritación gástrica.

CONTRAINDICACIONES:

No usar en:

- Hipersensibilidad al principio activo.
- Glaucoma de ángulo estrecho.
- Diskinesia tardía.
- Embarazo.

EFFECTOS INDESEABLES:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: visión borrosa, estreñimiento, disminución de la sudoración, dificultad o dolor en la micción, especialmente en hombres mayores, somnolencia, sequedad de boca, nariz o garganta, aumento de la sensibilidad de los ojos a la luz, náuseas o vómitos.

PRECAUCIONES:

Lactancia, pacientes geriátricos. Precaución en pacientes con: arritmias cardíacas, discinesia tardía, reacciones extrapiramidales, glaucoma, disfunción hepática y/o renal, hipertensión, obstrucción intestinal completa, parcial o antecedentes, miastenia gravis, hipertrofia prostática de moderada a intensa o retención urinaria.

INTERACCIONES:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta.

DOSIS:

La que su médico le indique.

Sin embargo, la dosis habituales son

Adultos y adolescentes:

Parkinsonismo:

Oral, de 1 a 2 mg el primer día, aumentando la dosificación con otros 2 mg más a intervalos de tres a cinco días hasta que se obtenga la respuesta deseada o hasta que la dosis diaria total sea de 6 a 10 mg, generalmente en tres tomas, una con cada comida.

Nota: Parkinsonismo post-encefálico: Puede ser necesaria una dosis total de 12 a 15 mg diarios .

Reacciones extrapiramidales inducidas por fármacos:

Oral, inicialmente 1 mg al día, aumentando la dosis según necesidades y tolerancia o hasta que la dosis diaria total sea de 5 a 15 mg.

Límites de prescripción en adultos:

Hasta 15 mg diarios.

Pediatría:

No se ha establecido la dosificación.

Geriatría:

Ver Dosis habitual para adultos y adolescentes.

Nota: Los pacientes geriátricos pueden ser más sensibles a los efectos de la dosis habitual para adultos.

MODO DE EMPLEO:

Administrar por vía oral.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños.

Mantener en su envase original, a no más de 25 °C.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MÉDICA.

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.



bph2016-01



BLACK

- Cutter Guide
- - Guide of Pleated
- Unvarnished area (internal)