

Quetiapina 200 mg- Caja por 30 Comprimidos Recubiertos



Fotografía referencia



## QUETIAPINA 200 mg

Drogas

Quetiapina

Clases Terapéuticas

Sistema Nervioso Central: Antipsicóticos Neurolépticos

Información farmacológica

- **Composición:** Cada comprimido recubierto contiene: Quetiapina 200 mg (como fumarato).
- **Indicaciones:** Tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento de los episodios maníacos asociados con el trastorno bipolar. Tratamiento de episodios depresivos asociados a trastorno bipolar. Prevención de recurrencias en tratamiento de mantención de desorden bipolar (episodios maníacos, mixtos o depresivos) en combinación con litio o valproato.
- **Posología: La dosis usual recomendada es:** **Esquizofrenia:** La quetiapina debe administrarse 2 veces al día, comenzando con dosis de 25 mg cada 12 horas y escalando en 50 mg/día hasta el día 4. A partir del día 5 en adelante, la dosis se debe titular al rango usualmente efectivo de 300 a 450 mg/día. Sin embargo, esto se puede ajustar dependiendo de la respuesta y tolerabilidad clínica del paciente, dentro del rango de 150 a 750 mg. **Tratamiento de episodios maníacos asociados con el trastorno bipolar:** La quetiapina debe administrarse 2 veces al día. La dosis diaria total al inicio de la terapia es 100 mg en el Día 1, 200 mg en el Día 2, 300 mg en el Día 3 y 400 mg en el Día 4. Se pueden realizar ajustes de dosis adicionales hasta 800 mg al día desde el Día 6 en incrementos no mayores de 200 mg al día. Los datos indican que la mayoría de los pacientes responden a dosis entre 400 mg al día a 800 mg al día. **Tratamiento de episodios depresivos asociados con el trastorno bipolar:** La quetiapina se debe administrar 1 vez al día, en la noche, hasta alcanzar 300 mg al día en el día 4 de acuerdo al siguiente esquema posológico. Día 1: 50 mg. Día 2: 100 mg. Día 3: 200 mg. Día 4: 300 mg. **Prevención de recurrencias del trastorno bipolar en combinación con litio o valproato:** Los pacientes que han respondido a quetiapina en terapia combinada con estabilizadores del ánimo (litio o valproato) para el tratamiento de desorden bipolar agudo deben continuar la terapia con quetiapina con la misma dosis. La dosis de quetiapina puede ser ajustada dependiendo de la respuesta clínica y tolerabilidad del paciente, dentro de un rango entre 400 a 800 mg/día. Los pacientes que han respondido a quetiapina para el tratamiento de desorden bipolar agudo deben continuar la terapia con quetiapina con la misma dosis. La dosis de quetiapina puede ser ajustada dependiendo de la respuesta clínica y tolerabilidad del paciente, dentro de un rango entre 300 a 800 mg/día. Dosis máxima en adultos 800 mg al día.
- **Contraindicaciones:** Antecedentes de hipersensibilidad a la quetiapina o a algún componente de la formulación.
- **Efectos Adversos:** No se alarme por esta lista de posibles reacciones adversas, ya que aquellas de carácter más grave sólo se producen en raras ocasiones.

Interrumpa el uso de este medicamento y busque asistencia médica inmediatamente si ocurren las siguientes reacciones adversas: Síntomas del síndrome neuroléptico maligno (dos o más síntomas ocurren simultáneamente). La mayoría de estos efectos no requieren atención médica de emergencia si ocurren solos: Convulsiones; dificultad para respirar o respiración inusualmente rápida; latidos cardíacos rápidos o pulso irregular; fiebre alta; presión arterial irregular (alta o baja); aumento de la sudoración; pérdida del control de la vejiga; rigidez muscular severa; piel inusualmente pálida; cansancio o debilidad inusuales.

Síntomas de discinesia tardía: Movimientos involuntarios de la boca, lengua, mejillas, mandíbula, brazos o piernas.

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este medicamento, acuda a un médico tan pronto como sea posible: Mareos, desvanecimiento o desmayos, especialmente al levantarse rápidamente después de estar sentado o acostado; fiebre, escalofríos, dolor muscular o dolor de garganta; pérdida del control del equilibrio; dificultad para caminar; erupción cutánea; lentitud de los movimientos; rigidez de los brazos o piernas; hinchazón de los pies o parte inferior de las piernas; temblores en las manos y dedos; dificultad para respirar, hablar o tragar.

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos adversos que normalmente no requieren atención médica, a menos que sean demasiado molestos o no desaparezcan durante el curso del tratamiento: Estreñimiento; somnolencia; sequedad de boca; aumento de peso; indigestión; dolor abdominal; visión anormal; disminución del



apetito; disminución de la fuerza y energía; latidos cardíacos rápidos o irregulares; dolor de cabeza; aumento del tono muscular; aumento de la sudoración; congestión nasal. Consulte a su médico si ocurre cualquier efecto adverso que no haya sido mencionado anteriormente.

- **Interacciones Medicamentosas:** Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Amiodarona; procainamida; amitriptilina; bepridil; tioridazina; furosemida; bumetanida; hidrocortisona; amfotericina B; cisplatino; fenitoína; carbamazepina; fenobarbital; rifampicina; glucocorticoides; cimetidina; claritromicina; diltiazem; eritromicina; fluconazol; ketoconazol; itraconazol; nafazodona; verapamilo; indinavir; nelfinavir; ritonavir; saquinavir; lorazepam; ropirinol; bromocriptina; pergolida; pramipexol; levodopa. La quetiapina puede aumentar los efectos de los antihipertensivos. Esto puede llevar a una presión arterial muy baja y producir mareos, desmayos y otros síntomas. La quetiapina puede incrementar los efectos de otros medicamentos que causan somnolencia, incluyendo antidepresivos, alcohol, antihistamínicos, sedantes, analgésicos, ansiolíticos, relajantes musculares, entre otros.
- **Presentaciones:** Envase conteniendo 30 comprimidos recubiertos.