


## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

## OLMESARTÁN MEDOXOMILO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 mg

Olmesartan Medoxomil Comprimidos Recubiertos 20 mg

Olmesartan Medoxomil Comprimidos Recubiertos 40 mg



Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

**Contenido del prospecto**

1. Qué es Olmesartan Medoxomil y para qué se utiliza

Olmesartan **Medoxomilo** Comprimidos Recubiertos 20 mg

Cada comprimido recubierto contiene:

Olmesartán medoxomilo **20 mg**.

**Excipientes:** ~~(según lo aprobado en el registro)~~ lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, hiprolosa baja sustitución, hiprolosa, celulosa microcristalina, ácido esteárico, estearato de magnesio, talco, dióxido de titanio c.s.

Olmesartan **Medoxomilo** Comprimidos Recubiertos 40 mg

Cada Comprimido Recubierto contiene:

**Olmesartan Medoxomilo 40 mg**

**Excipientes:** lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, hiprolosa, Hiprolosa de baja sustitución, ácido esteárico, estearato de magnesio, talco, dióxido de titanio c.s.

Qué necesita saber antes de empezar a tomar Olmesartan Medoxomil

3. Cómo tomar Olmesartan Medoxomil
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Olmesartan Medoxomil
6. Contenido del envase e información adicional

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

## OLMESARTÁN MEDOXOMILO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 mg

## 1. Qué es Olmesartan Medoxomil y para qué se utiliza

Olmesartan Medoxomil pertenece al grupo de medicamentos conocidos como antagonistas de los receptores de la angiotensina II. Disminuye la presión arterial relajando los vasos sanguíneos. Olmesartan Medoxomil se utiliza en el tratamiento de la presión arterial alta (también conocida como hipertensión).

La presión arterial alta puede dañar los vasos sanguíneos en órganos como el corazón, riñones, cerebro y ojos. En algunos casos esto puede llevar a un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca o renal, accidente cerebrovascular o ceguera. Normalmente, la presión arterial alta no presenta síntomas. Es importante controlar su presión arterial para evitar la aparición de daños.

La presión arterial alta puede controlarse con medicamentos como Olmesartan Medoxomil comprimidos. Su médico probablemente también le ha recomendado que haga algunos cambios en su estilo de vida para ayudarle a disminuir su presión arterial (por ejemplo, perder peso, dejar de fumar, reducir la cantidad de alcohol que bebe y reducir la cantidad de sal de su dieta). Su médico también le puede recomendar que haga ejercicio de forma regular, como caminar o nadar. Es importante seguir este consejo de su médico.

## 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Olmesartan Medoxomil

**No tome Olmesartan Medoxomil**

- Si es alérgico a olmesartán medoxomilo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si está embarazada ~~o en período de lactancia de más de 3 meses. (También es mejor evitar Olmesartan Medoxomil comprimidos al inicio del embarazo - ver sección Embarazo).~~
- Si tiene color amarillento de piel y ojos (ictericia), o problemas con el drenaje de bilis de la vesícula biliar (obstrucción biliar, por ejemplo, por cálculos biliares).
- Si tiene diabetes o insuficiencia renal y le están tratando con un medicamento para bajar la presión arterial que contiene aliskirén.

**Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico antes de empezar a tomar Olmesartan Medoxomil .

**Dígale a su médico** si está tomando alguno de los siguientes medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta (hipertensión):

- un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) (por ejemplo enalapril, lisinopril, ramipril), en particular si sufre problemas renales relacionados con la diabetes.
- aliskirén.

Puede que su médico le controle la función renal, la presión arterial y los niveles de electrolitos en la sangre (por ejemplo, potasio), a intervalos regulares.

Ver también la información bajo el encabezado "No tome Olmesartan Medoxomil".

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE****OLMESARTÁN MEDOXOMILO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 mg**

**Dígale a su médico** si tiene alguno de los problemas de salud siguientes:

- Problemas renales.
- Enfermedad hepática.
- Insuficiencia cardíaca o problemas con las válvulas cardíacas o del músculo cardíaco.
- Vómitos graves, diarrea, tratamiento con dosis elevadas de medicamentos que aumentan la eliminación de orina (diuréticos), o si está tomando una dieta baja en sal.
- Niveles elevados de potasio en sangre.
- Problemas con las glándulas suprarrenales.

Contacte con su médico si sufre una diarrea grave, persistente y que le cause una pérdida de peso importante. Su médico evaluará sus síntomas y decidirá cómo seguir con su tratamiento para la presión arterial.

Al igual que ocurre con cualquier otro medicamento que reduzca la presión arterial, una disminución excesiva de la presión arterial en pacientes con alteraciones del flujo sanguíneo en el corazón o en el cerebro, puede producir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Por eso su médico controlará cuidadosamente su presión arterial.

Debe informar a su médico si está embarazada o piensa que pudiera estarlo. No se recomienda el uso de Olmesartan Medoxomil al inicio del embarazo, y no se debe tomar si usted está embarazada de más de 3 meses, ya que puede causar daños graves a su bebé si lo toma en esta etapa (ver sección Embarazo).

**Niños y adolescentes** Olmesartan Medoxomil no está recomendado para niños y adolescentes menores de 18 años.

**Uso de Olmesartan Medoxomil con otros medicamentos**

Comuníquese a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquiera de los siguientes medicamentos:

- Otros medicamentos reductores de la presión arterial, porque pueden incrementar el efecto de Olmesartan Medoxomil.

Puede que su médico deba modificar su dosis y/o tomar otras precauciones:

Si está tomando un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o aliskirén (ver también la información bajo los encabezados "No tome Olmesartan Medoxomil" y "Advertencias y precauciones").

- Suplementos de potasio, sustitutos de la sal que contengan potasio, medicamentos que aumentan la eliminación de orina (diuréticos), o heparina (para fluidificar la sangre). El uso de estos medicamentos al mismo tiempo que Olmesartan Medoxomil puede elevar los niveles de potasio en sangre.

- El litio (medicamento empleado para tratar los cambios del estado de ánimo y algunos tipos de depresión), ya que empleado a la misma vez que Olmesartan Medoxomil puede incrementar su toxicidad. Si usted tiene que tomar litio, su médico medirá los niveles de litio en sangre.

- Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (medicamentos para aliviar el dolor, hinchazón y otros síntomas de la inflamación, incluyendo artritis), ya que empleados a la misma vez que Olmesartan Medoxomil pueden incrementar el riesgo de insuficiencia renal y disminuir el efecto de Olmesartan Medoxomil.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE****OLMESARTÁN MEDOXOMILO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 mg**

- Colesevelam hidrocloreuro, un medicamento que disminuye el nivel de colesterol en sangre, ya que puede disminuir el efecto de Olmesartan Medoxomil . Puede ser que su médico le aconseje tomar Olmesartan Medoxomil al menos 4 horas antes de colesvelam hidrocloreuro.
- Ciertos antiácidos (remedios para la indigestión), ya que pueden reducir ligeramente el efecto de Olmesartan Medoxomil .

**Pacientes de edad avanzada**

Si usted tiene más de 65 años y su médico decide incrementar la dosis de olmesartán medoxomilo hasta 40 mg al día, su médico le controlará regularmente la presión arterial, para asegurarse de que no disminuya demasiado.

**Pacientes de raza negra**

Como sucede con otros medicamentos similares, el efecto reductor de la presión arterial de Olmesartan Medoxomil es algo menor en pacientes de raza negra.

**Toma de Olmesartan Medoxomil con alimentos y bebidas**

Olmesartan Medoxomil se puede tomar con o sin alimentos.

**Embarazo y lactancia****Embarazo**

Debe informar a su médico si está embarazada, o si piensa que pudiera estarlo. Su médico le aconsejará que deje de tomar Olmesartan Medoxomil antes de quedarse embarazada o tan pronto como usted sepa que está embarazada, y le aconsejará que tome otro medicamento en lugar de Olmesartan Medoxomil . No se recomienda el uso de Olmesartan Medoxomil al inicio del embarazo, y no se debe tomar cuando se está embarazada de más de 3 meses, ya que puede causar daños graves a su bebé si se utiliza a partir del tercer mes del embarazo.

**Lactancia**

Informe a su médico si está en periodo de lactancia o a punto de iniciar la lactancia. No se recomienda Olmesartan Medoxomil en madres que estén en periodo de lactancia, y su médico puede elegir otro tratamiento si usted desea dar de mamar, especialmente si su bebé es recién nacido o prematuro.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

**Conducción y uso de máquinas**

Usted puede sentir sueño o mareo durante el tratamiento de la hipertensión arterial. Si esto sucede, no conduzca ni utilice máquinas hasta que los síntomas hayan desaparecido. Consulte a su médico.

**Olmesartan Medoxomil contiene lactosa**

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

## OLMESARTÁN MEDOXOMILO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 mg

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

**3. Cómo tomar Olmesartan Medoxomil**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.

En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada inicial es de 1 comprimido de Olmesartan Medoxomil **20 mg una vez al día, 10 mg al día**. En caso de que la presión arterial no se controle adecuadamente, su médico puede aumentar la dosis hasta ~~20 mg~~ 40 mg al día o prescribir un tratamiento adicional.

En pacientes con insuficiencia renal leve a moderada la dosis máxima es de 20 mg una vez al día.

Los comprimidos se pueden tomar con o sin alimentos. Tome los comprimidos con una cantidad suficiente de agua (por ejemplo, un vaso). Si es posible, tome su dosis a la misma hora cada día, por ejemplo a la hora del desayuno.

**Si toma más Olmesartan Medoxomil del que debe**

En caso de tomar una cantidad de comprimidos superior a la necesaria o de que un niño haya ingerido accidentalmente comprimidos, contacte inmediatamente con el médico o el centro de urgencias del hospital más próximo y lleve con usted el envase del medicamento.

**Si olvidó tomar Olmesartan Medoxomil**

Si olvidó tomar una dosis, tome la dosis habitual al día siguiente. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

**Si interrumpe el tratamiento con Olmesartan Medoxomil**

Es importante continuar tomando Olmesartan Medoxomil, salvo que su médico le diga que interrumpa el tratamiento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

**4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Si éstos se producen, a menudo son leves y no requieren interrumpir el tratamiento.

Los dos siguientes efectos adversos pueden ser graves, aunque no muchas personas puedan tenerlos.

En casos raros (pueden afectar hasta 1 de 1.000 personas) se han notificado las siguientes reacciones alérgicas, que pueden afectar a todo el cuerpo: inflamación de la cara, boca y/o laringe, junto con picor y erupción cutánea. **Si esto le sucede, deje de tomar Olmesartan Medoxomil y consulte inmediatamente con su médico.**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE****OLMESARTÁN MEDOXOMILO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 mg**

De forma rara (pero ligeramente más a menudo en pacientes de edad avanzada) Olmesartan Medoxomil puede producir una bajada pronunciada de la presión arterial, en pacientes susceptibles o como resultado de una reacción alérgica. Esto puede producir desvanecimiento o mareo grave. **Si esto le sucede, deje de tomar Olmesartan Medoxomil, consulte inmediatamente con su médico y permanezca tumbado en posición horizontal.**

Estos son otros efectos adversos conocidos hasta ahora con Olmesartan Medoxomil :

**Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de 10 personas):**

Mareo, dolor de cabeza, náuseas, indigestión, diarrea, dolor de estómago, gastroenteritis, fatiga, dolor de garganta, congestión y secreción nasal, bronquitis, síntomas similares a los de la gripe, tos, dolor, dolor en el pecho, dolor de espalda, dolor óseo, dolor de las articulaciones, infección del tracto urinario, hinchazón de tobillos, pies, piernas, manos, brazos, sangre en orina.

También se han observado algunos cambios en los resultados de ciertas pruebas analíticas en sangre: aumento de los niveles de grasa (hipertrigliceridemia), aumento de los niveles de ácido úrico (hiperuricemia), aumento de urea en sangre, incrementos en los valores de las pruebas de la función hepática y muscular.

**Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de 100 personas):**

Reacciones alérgicas rápidas que pueden afectar a todo el cuerpo y pueden causar problemas de respiración, así como una rápida disminución de la presión arterial que puede llevar incluso al desmayo (reacciones anafilácticas), vértigo, vómitos, debilidad, sensación de malestar, dolor muscular, erupción cutánea, erupción cutánea alérgica, picor, exantema (erupción de la piel), hinchazón de la piel (ronchas), angina de pecho (dolor o sensación de malestar en el pecho). En pruebas analíticas en sangre se ha observado una disminución del número de un tipo de células sanguíneas llamadas plaquetas (trombocitopenia).

**Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de 1.000 personas):**

Falta de energía, calambres musculares, empeoramiento de la función renal, fallo renal. Se han observado algunos cambios en los resultados de ciertas pruebas en sangre. Estos incluyen aumento de los niveles de potasio en sangre (hiperpotasemia) y aumento de los niveles de componentes relacionados con la función renal.

**Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

**5. Conservación de Olmesartan Medoxomil**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

## OLMESARTÁN MEDOXOMILO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 mg

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase y en el blíster.

Almacenar a no más de ~~25~~ 30 °C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

~~6. Contenido del envase e información adicional~~~~Composición de Olmesartan Medoxomil~~~~El principio activo es olmesartán medoxomilo.~~~~Olmesartan Medoxomil Comprimidos Recubiertos 20 mg~~~~Cada comprimido recubierto contiene:~~~~20 mg de olmesartán medoxomilo.~~~~Excipientes: (según lo aprobado en el registro)~~~~Olmesartan Medoxomil Comprimidos Recubiertos 40 mg~~~~Cada comprimido recubierto contiene:~~~~40 mg de olmesartán medoxomilo.~~~~Excipientes: (según lo aprobado en el registro)~~~~Referencia:~~~~Folleto de Información al Paciente para "Olmetec 20 mg comprimidos recubiertos" y "Olmetec 40 mg comprimidos recubiertos" publicado en página web Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>.~~