

MONOGRAFIA CLINICA FARMACOLOGICA EPINEFRINA, Solución Inyectable 1 mg / 1 mL

ADRENÉRGICO - ANTIASMÁTICO

INDICACIONES

Estimulante en paro cardíaco
Reacciones anafilácticas graves
En el tratamiento del asma bronquial
Vasoconstrictor local

CONTRAINDICACIONES

No debe ser administrada intraarterialmente, ni tampoco si existe hipersensibilidad a alguno de sus componentes. También está contraindicada en aquellas personas que sufren de: daños cerebrales, enfermedad cardiovascular incluyendo angina pectoral, arritmias cardíacas, dilatación cardíaca, arterioesclerosis cerebral, hipertensión, glaucoma de ángulo estrecho; shock traumático o hemorrágico, hipertiroidismo, enfermedad de Parkinson, desórdenes psiconeuróticos. No debe ser usada para contrarrestar la hipotensión producida por fenotiazida.

PRECAUCIONES

Debe administrarse con precaución a enfermos coronarios, hipertensos, arterioscleróticos e hipertiroides.

REACCIONES ADVERSAS

Puede presentar ansiedad, palpitaciones, taquicardia, cefaleas y frialdad en las extremidades. En algunas ocasiones se pueden desencadenar arritmias en enfermos cardíacos.

VIA DE ADMINISTRACION – POSOLOGIA

Vía de administración: Intravenosa – Intramuscular – Subcutánea

Posología: Según indicación médica

Dosis usual: en crisis asmáticas y reacciones alérgicas de 0,5 mg a 1 mg por vía subcutánea, dependiendo la dosis, según la gravedad y edad del paciente.