

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**MAALOX SUSPENSIÓN ORAL**

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
S. I. P. A. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA MODIFICACIONES	
30 ENE. 2013	
N° Ref.:	MT415289/13
N° Registro:	F-327/12
Firma Profesional:	<i>[Firma]</i>

Aspecto: Sobredosis/Intoxicación

Se incorpora la siguiente información:
SOBREDOSIS

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse Centro de Información Toxicológica teléfono 26353800.

Signos y síntomas

Los síntomas de sobredosis aguda reportados con combinaciones de hidróxido de aluminio y sales de magnesio incluyen diarrea, dolor abdominal, vómitos.

Dosis elevadas de este producto puede gatillar o agravar obstrucción intestinal e ileo en pacientes en riesgo (Ver sección Advertencias).

Manejo

Aluminio y magnesio son eliminados por vía urinaria el tratamiento de una sobredosis aguda consiste en: rehidratación, forzar diuresis. En caso de función renal deficiente, es necesario hemodiálisis o diálisis peritoneal.

Aspecto: Precauciones/Advertencias

Se incorpora la siguiente información:

El hidróxido de aluminio puede causar constipación y la sobredosis de sales de magnesio puede causar, disminución de la motilidad intestinal grandes dosis de este producto pueden desencadenar o agravar una obstrucción intestinal e íleo en pacientes de alto riesgo, como aquellos con insuficiencia renal, lactantes menores de 2 años, o ancianos

Las dosis excesivas o el uso prolongado, o incluso dosis normal en pacientes con dietas bajas en fósforo o en niños menores de 2 años, puede llevar a depleción de fosfato (debido a la unión fosfato-aluminio) acompañado de reabsorción ósea mayor e hipercalcemia con el riesgo de osteomalacia (dolencia a los huesos caracterizada por pérdida de minerales). Se recomienda consultar al médico en caso de uso prolongado o en pacientes con riesgo de depleción de fosfato.

Se elimina la siguiente información:

En presencia de dietas bajas en fósforo, el hidróxido de aluminio puede causar deficiencia de fósforo.

Lactancia

Aunque no se han observado efectos negativos en el bebe, con el uso de este medicamento.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MAALOX SUSPENSIÓN ORAL

Aspecto: Interacciones

Se incorpora la siguiente información:

...drogas tales como ...cefdinir, cefpodoxima, ...levotiroxina...rosuvastatina...

- Poliestireno sulfonato (Kayexalate) se recomienda precaución con el uso concomitante con este producto .

Aspecto: Efectos Adversos/No deseados

Se incorpora la siguiente información:

...con poca frecuencia ...

Con frecuencia indeterminada puede ocurrir: reacciones de hipersensibilidad, como prurito, urticaria, angioedema y reacciones anafilácticas aumento de los niveles de magnesio (hipermagnesemia), aluminio(hiperaluminemia) y disminución de fósforo en sangre(hipofosfatemia) que puede resultar en reabsorción ósea mayor, hipercalciuria, osteomalacia.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE**