

Front Side

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

IMIPRAMINA CLORHIDRATO

Grageas 25 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada Gragea contiene: Imipramina clorhidrato 25 mg.

Excipientes: Almidón de maíz, Fosfato de calcio dibásico, Talco, Estearato de magnesio, Almidón de sodio glicolato, Carbonato de calcio, Caolín, Polividona, Sucrosa, Metilparabeno, Propilparabeno, Gelatina, Goma de acacia, Cera carnaúba, Cera de abejas, Colorante F D & C Amarillo N°6.

Envase con 40 grageas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

CLASIFICACIÓN:

Antidepresivo tricíclico. Antienurético.

INDICACIÓN:

Todas las formas de depresión endógena, formas orgánicas y psicogénicas y depresión asociada con trastornos de la personalidad o alcoholismo crónico.

Ataques de pánico.

Condiciones dolorosas crónicas.

Pavor nocturno.

Enuresis nocturna (sólo en pacientes de 5 o más años de edad y sólo si las causas orgánicas están descartadas).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Antes de usar este medicamento se debe sopesar los riesgos y beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

a) Alergias: Usted debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado alguna reacción alérgica a este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.

b) Embarazo: No se recomienda su uso en mujeres embarazadas

c) Lactancia: No se recomienda su uso en mujeres nodrizas

d) Otros: enzimático hepático de la monooxigenasa: Barbitúricos, Fenitoína, Nicotina; con neurolépticos: Fenotiazinas; Disulfiram; algunas benzodiacepinas : Alprazolam (pero no diazepam); Cimetidina (pero no Ranitidina), Metilfenidato, Estrógenos, medicamentos usados para enfermedades de la tiroides, medicamentos para controlar el asma u otros problemas respiratorios.

Back Side

EFFECTOS ADVERSOS (NO DESEADOS):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos requieren atención médica:

Visión borrosa, movimientos de masticación, movimientos de succión y abocinamiento de los labios, movimiento de inflado de mejillas, movimientos de la lengua rápidos o semejantes a los de un gusano, movimientos incontrolados de los brazos o piernas, confusión, delirio o alucinaciones, estreñimiento especialmente en ancianos, micción dificultosa, dificultad al hablar o al tragar, pérdida del control del equilibrio, cara de máscara, marcha arrastrando los pies, movimientos lentos, rigidez de los brazos o piernas, temblor y agitación de los dedos y manos, dolor de ojos, desmayos, latidos cardíacos rápidos, lentos o irregulares, nerviosismo o inquietud, disfunción sexual, agitación, coloración amarillenta de piel u ojos.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento): mareos, somnolencia, sequedad de la boca, dolor de cabeza, aumento de apetito por los dulces, náuseas, cansancio o debilidad ligeros, sabor de la boca desagradable, aumento de peso.

No obstante, si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico.

Si Ud. nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte con el médico.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada para adultos es: 25 mg a 50 mg 3 ó 4 veces al día, ajustando la dosificación según necesidades y tolerancia.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original, almacenado a no más de 30°C. No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona



BDH INDUSTRIES LTD.
Nair Baug, Akurli Road, Kandivli (East),
Mumbai - 400 101, INDIA.