



ASCEND

Levera 1000 Levetiracetam 1000 mg 30 Comprimidos Recubiertos



Composición cualitativa y cuantitativa
Cada comprimido recubierto contiene:
levetiracetam 1000 mg

Excipientes: Povidona, croscarmelosa sódica, macrogol, dióxido de silicio coloidal anhidro, estearato de magnesio, alcohol polivinílico, dióxido de titanio, talco, e.s.

Via de Administración: Oral.
Posología: Según indicación médica.
Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Almacenamiento: Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacenar a no más de 25°C.

Reg. ISP N°: F-24339

Mfg. Lic. No.: 38/AJA/2007

Bioequivalente

Fabricado para Ascend Laboratories SpA, Apoquindo N° 4700, Oficina 1701, Las Condes, Santiago, Chile, por Jubilant Generics Limited, Village Sikondarpur Bhatnagar, Roorki-Dehradun Highway, Bhagwanpur, Roorki, Distt - Haridwar, Uttarakhand- 247 661, India. Importado por Ascend Laboratories S.p.A Distribuido por Biomedical distribución Chile Limitada, La Baza N°120B, Pudahuel, Santiago; Laboratorios Pharma Sa (da), Av. Costa Color 263, Guatima, Santiago; Goldenhoze S.A., Camino Vecinal N°8370 Módulos 25, 26 y 27, Renca, Santiago, Chile.

Mayor información en www.ispch.cl



7 804650 883128

Bioequivalente



LEVERA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1000 mg
Principios activos: Levetiracetam 1000 mg



Excipientes: Povidona K-30, Macrogol 6000, Dióxido de silicio coloidal anhidro, Estearato de Magnesio, Croscarmelosa Sódica, Dióxido de titanio, Macrogol 3350, Talco, Óxido de hierro amarillo.

Contraindicaciones: Reacciones de hipersensibilidad al Levera o a otros derivados de los pirrolidonas o a alguno de sus excipientes.

Reacciones adversas: Las reacciones adversas más frecuentemente reportadas fueron nasofaringitis, somnolencia, cefalea, fatiga y mareo. El perfil de seguridad de Levera es generalmente similar entre los grupos de edad (pacientes adultos y pediátricos) y entre las indicaciones para epilepsia aprobadas.

Infecciones e infestaciones: Muy común: nasofaringitis. Rara: infección.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático:

Poco común: trombocitopenia, leucopenia. Rara: pancitopenia, neutropenia.

Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Común: anorexia. Poco común: peso disminuido, aumento de peso.

Trastornos psiquiátricos: Común: depresión, hostilidad/agresión, ansiedad, insomnio, nerviosismo/irritabilidad. Poco común: intento de suicidio, ideación suicida, trastorno psicótico, comportamiento anormal, alucinación, reacción de ira, estado confusional, labilidad afectiva/cambios del estado de ánimo, agitación. Rara: suicidio consumado, trastorno de la personalidad, pensamiento anormal.

Trastornos del sistema nervioso: Muy común: somnolencia, cefalea.

Común: convulsión, trastorno del equilibrio, mareo, letargo, temblor. Poco común: amnesia, alteración de la memoria, coordinación anormal/ataxia, parestesia, alteración de la atención. Rara: coreoatetosis, discinesia, hiperquinesia.

Trastornos oculares: Poco común: diplopía, visión borrosa.

Trastornos del oído y del laberinto: Común: vértigo.

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Común: tos.

Trastornos gastrointestinales: Común: dolor abdominal, diarrea, dispepsia, vómito, náusea. Rara: pancreatitis.

Trastornos hepatobiliares: Poco común: Prueba anormal de función hepática. Rara: insuficiencia hepática, hepatitis.

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Común: erupción. Poco común: alopecia, eczema, prurito. Rara: necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme.

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Poco común: debilidad muscular, mialgia.

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:

Común: astenia, fatiga.

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos: Poco común: lesión.