



Zavicefta[®]

**Ceftazidima Pentahidrato y
Avibactam Sódico 2 g/0,5 g**

Polvo para solución para perfusión

Vía de administración intravenosa

10 Viales

Composición:

Cada vial contiene ceftazidima (como pentahidrato) equivalente a 2 g y avibactam (como sal sódica) equivalente a 0,5 g. Excipiente: Carbonato de sodio estéril, c.s.

Reconstitución:Inyección intravenosa.

Los viales de ceftazidima/avibactam polvo se deben reconstituir con 10 mL de agua estéril para inyección y luego agitar hasta que el contenido se disuelva.

Una bolsa de perfusión puede contener cualquiera de los siguientes elementos: solución para inyección de cloruro de sodio 9 mg/mL (al 0,9%), solución para inyección de dextrosa 50 mg/mL (al 5%), solución para inyección de cloruro de sodio 4,5 mg/mL y dextrosa 25 mg/mL (cloruro de sodio al 0,45% y dextrosa al 2,5%) o solución de Ringer Lactato.

Almacenar a temperatura no mayor a 30° C. Después de diluido debe administrarse dentro de las 12 horas a temperatura ambiente después de la preparación.

EL USO DE ESTE MEDICAMENTO EXIGE DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN MÉDICA.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

R = Receta Simple

Dosis única solamente

Reg. I.S.P. N°: F-24968

Mayor información en www.ispch.cl



62000000017674



Vía de administración intravenosa
10 Viales

Zavicefta[®]

**Ceftazidima Pentahidrato y
Avibactam Sódico 2 g/0,5 g**

Polvo para solución para perfusión

Vía de administración intravenosa

10 Viales

PC: 05013457012132

Lote:

Fab:

Exp:

JE7N1
10-2018
09-2021



Zavicefta[®]

**Ceftazidima Pentahidrato y
Avibactam Sódico 2 g/0,5 g**

Polvo para solución para perfusión

Vía de administración intravenosa

10 Viales