

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**BUD-ALART HFA AEROSOL PARA INHALACIÓN 200mcg / dosis**

4.- ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

5.- ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis siguiente, salte la que olvidó y continúe con su horario de medicación normal. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

6.- ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento? La **Budesónida** puede provocar efectos secundarios. Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece:

- | | |
|--|----------------------|
| * Sequedad o irritación en la boca o la garganta | * Tos |
| * Dificultad o dolor al hablar | * Mareos |
| * Dificultad para dormirse o permanecer dormido | * Dolor en el cuello |
| * Dolor de estómago | |

Si presenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato:

- | | |
|--|--|
| * Problemas de visión | * Aparición de manchas blancas o llagas en la boca |
| * Hinchazón de cara, pantorrillas o tobillos | * Resfriado o infección que duran mucho tiempo |
| * Debilidad muscular | * Mayor dificultad para respirar |
| * Erupciones en la piel | * Sangrado o moretones fuera de lo común |
| * Fiebre | * Dolor de garganta |
| * Dolor al orinar | * Dolores musculares |

Si le indicaron cambiar de los corticosteroides orales a **Budesónida** y está disminuyendo en forma gradual las dosis del medicamento oral y tiene cualquiera de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato:

- | | |
|--|----------------------------------|
| * Dolor en las articulaciones o los músculos | * Mayor dificultad para respirar |
| * Cansancio | |

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**BUD-ALART HFA AEROSOL PARA INHALACIÓN 200mcg / dosis**

7.- ¿Cómo debo almacenar este medicamento? Mantenga este producto en su envase original, perfectamente cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente **a no más de 30°C** y en un lugar alejado del exceso de calor y humedad (nunca en el cuarto de baño). Deseche todos los medicamentos que estén vencidos o que ya no necesite. Pregúntele a su farmacéutico cuál es la manera adecuada de desechar los medicamentos.

8.- ¿Qué otra información de importancia debería saber? No falte a ninguna cita con su médico y con el laboratorio. Si el esputo (material que usted expulsa por la boca durante un ataque de asma) se vuelve más espeso o cambia el color, de blanco y transparente a amarillo, verde o gris, llame a su médico, ya que eso puede ser un signo de infección.

Sólo una pequeña cantidad de **Budesónida** llega a los pulmones cada vez que inhala. Por lo tanto, aunque no perciba ningún sabor ni la presencia del medicamento, el medicamento estará actuando en los pulmones.

Los dispositivos de respiración o inhalación requieren limpieza periódica. Siga las instrucciones de cuidado y limpieza que vienen con el inhalador.

No permita que ninguna otra persona use sus medicamentos. Pregúntele a su farmacéutico cómo puede volver a surtir su receta.

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en casos de emergencia.

**MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS
ALMACENE EN LUGAR FRESCO Y SECO, A NO MÁS DE 30°C
NO PERFORE NI INCINERE EL ENVASE LUEGO DE UTILIZAR**