


FICHA TÉCNICA

**INSTRUCTIVO
GELCLAIR®**

**FICHA TÉCNICA:
INSTRUCTIVO GELCLAIR®**

GELCLAIR® GEL ORAL CONCENTRADO	<p>Las mucositis y estomatitis son formas inflamatorias que se manifiestan a nivel de la mucosa bucal con lesiones eritematosas parecidas a quemaduras y en ocasiones, con lesiones de tipo ulceroso especialmente dolorosas que llegan a dificultar la masticación y la deglución que lo pueden llevar a deshidratación, con lo cual la calidad de vida del paciente se ve seriamente afectada.</p> <p>Dicha afección puede extenderse a otras partes del tracto gastrointestinal, particularmente tras el uso de fármacos antineoplásicos.</p> <p>Síntomas de mucositis son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dolor• Enrojecimiento• Inflamación• Irritación• Ulceras <p>Como consecuencia el paciente tiene dificultad para masticar, comer, beber y dormir.</p>
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: GELCLAIR®	<p>Es un gel viscoso, expresamente formulado como coadyuvante en el tratamiento de las lesiones de la mucosa bucal.</p> <p>Forma una película protectora que al adherirse a la mucosa de la cavidad bucofaríngea recubre las terminaciones nerviosas expuestas, así protege a la mucosa lesionada y evita la irritación, además hidrata y lubrica la boca.</p> <p>De esta forma contribuye a aliviar rápidamente el dolor de la cavidad oral, permitiendo la alimentación del paciente</p>

**FICHA TÉCNICA:
INSTRUCTIVO GELCLAIR®**

INDICACIONES	<p>Coadyuvante en el tratamiento de las lesiones de la cavidad bucofaríngea.</p> <p>Gelclair® forma una película protectora a la cavidad bucal gracias al efecto mecánico de barrera, con alivio del dolor generado por estados irritativos e inflamatorios de la cavidad bucal, de diversas etiologías:</p> <ul style="list-style-type: none">• Quimioterapia, radioterapia.• Intervenciones quirúrgicas de la cavidad oral• Ulceras traumáticas causadas por aparatos de ortodoncia, las dentaduras y la vejez.• Enfermedades como candidiasis, herpes oral u otras. 
INGREDIENTES	Agua purificada, polivinilpirrolidona (PVP), maltodextrina, propilenglicol, aceite de ricino hidrogenado PEG 40, sorbato de potasio, benzoato de sodio, hidroxietilcelulosa, cloruro de benzalconio, aromatizante, edetato disódico, sacarina sódica, hialuronato de sodio, ácido glicirretínico.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA	<p>No se recomienda ingerir sólidos o líquidos durante una hora después de su utilización. No emplear el producto si el envase está incompleto o después de su fecha de caducidad.</p> <p>Un ligero espesamiento del gel o un tenue cambio en su color no alteran su eficacia y seguridad. Consérvese a temperatura ambiente y lejos de fuentes luminosas.</p> <p>No refrigerar.</p>

**FICHA TÉCNICA:
INSTRUCTIVO GELCLAIR®**

MODO DE USO	<p>Gelclair® gel oral concentrado sobres de 15 ml: Verter el contenido de un sobre en un vaso, añadir aproximadamente de 15 a 40 mL de agua (1-3 cucharadas soperas) y mezclar hasta obtener una solución uniforme.</p> <p>Con la solución obtenida, enjuagar inmediatamente la boca, hacer gárgaras para recubrir los tejidos de la cavidad bucofaringea, manteniéndolo por lo menos durante un minuto y escupir la solución.</p> <p>Gelclair® puede utilizarse también sin diluir en caso de no disponer de agua. No ingerir. Desechar la cantidad de enjuague bucal no utilizada.</p>
GELCLAIR®: Modo de Uso	
	 <p>Vierta el contenido del sobre en un vaso con 15 a 40 ml de agua.</p>
	 <p>Mezclar perfectamente bien con una cuchara y utilizar inmediatamente.</p>
	 <p>Hacer buches por lo menos por un minuto o por el mayor tiempo posible. Impregnar todas las paredes de la cavidad oral incluyendo a la lengua.</p>
	 <p>Hacer gárgaras y expulsar el contenido fuera de la boca.</p>
	 <p>No deglutar.</p>

**FICHA TÉCNICA:
INSTRUCTIVO GELCLAIR®**

EFEKTOS ADVERSOS	Hasta la fecha no se han descrito efectos colaterales indeseados. Sin embargo, no se aconseja la utilización del producto a personas con hipersensibilidad comprobada a alguno de sus ingredientes.
MODO DE EMPLEO	Gelclair® se emplea tres veces al día o a necesidad.
PRECAUCIONES	Hipersensibilidad comprobada a algunos de sus componentes.
REACCIONES ADVERSAS	Hasta la fecha no se han descrito.
PRESENTACIÓN	Sobres monodosis de 15 ml que deben diluirse antes de su utilización.
EL PRODUCTO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.	
HECHO EN ITALIA POR	BIOKOSMES s.r.l. Via dei Livelli no. 1 Bosisio Parini, Lecco, Italia.
IMPORTADO POR	Laboratorio Kampar S.A., San Sebastián 2839 Of. 701-B, Las Condes, Santiago. Almacenado y distribuido en Chile por, Laboratorio Pharma Isa Ltda., Colo Colo 263, Quilicura, Santiago, para Laboratorio Kampar S.A., San Sebastián 2839 Of. 701-B, Las Condes, Santiago. Bajo licencia de: Helsinn Healthcare SA., Lugano, Suiza.



Material de uso exclusivo para profesionales de la salud.