

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**CILOSVITAE COMPRIMIDOS 50 mg**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

~~**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted**~~

~~Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo~~
~~Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico~~
~~Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles~~
~~Si experimenta efectos adversos consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.~~

Composición:

Cada comprimido contiene:

Cilostazol: 50 mg

Excipiente(s) c.s: almidón de maíz, celulosa microcristalina, hipromelosa, carmelosa cálcica, estearato de magnesio.

Contenido del prospecto

1. Qué es Cilosvitae y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Cilosvitae
3. Cómo tomar Cilosvitae
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Cilosvitae
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Cilosvitae y para qué se utiliza

Cilosvitae pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 3. Presenta diversas acciones entre las que se incluye la dilatación de ciertos vasos sanguíneos y la reducción de la actividad coagulante (aglutinación) de ciertas células sanguíneas, llamadas plaquetas, en los vasos sanguíneos.

Se le ha recetado Cilosvitae para la "claudicación intermitente". La claudicación intermitente es el dolor en forma de calambres que sufre en las piernas al caminar y que está causada por un suministro insuficiente de sangre a las piernas. Cilosvitae puede ayudarle a aumentar la distancia caminada, ya que mejora la circulación sanguínea en las piernas. Solo se recomienda cilostazol para los pacientes cuyos síntomas no han mejorado lo suficiente después de haber hecho cambios en su estilo de vida (como por ej., haber dejado de fumar y hacer más ejercicio) y tras otras intervenciones apropiadas. Es importante que continúe con los cambios que haya hecho en su estilo de vida mientras toma cilostazol.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Cilosvitae**No tome Cilosvitae**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**CILOSVITAE COMPRIMIDOS 50 mg**

- si es alérgico (hipersensible) al cilostazol o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- si sufre un trastorno conocido como "insuficiencia cardíaca".
- si sufre de dolor en el pecho persistente en reposo, o ha tenido un ζ ataque cardíaco ζ o cualquier cirugía del corazón en los últimos seis meses.
- si sufre o ha sufrido previamente desvanecimientos debidos a una enfermedad del corazón o trastornos graves de los latidos del corazón.
- si sabe que sufre algún trastorno que aumente el riesgo de hemorragia o moratones, como por ejemplo:
 - úlceras activas en el estómago.
 - apoplejía (ictus) durante los seis últimos meses.
 - problemas oculares si sufre diabetes.
 - tensión arterial no controlada adecuadamente.
 - si está tomando ácido acetilsalicílico y clopidogrel, o cualquier combinación de dos o más medicamentos que podrían aumentar su riesgo de sufrir hemorragias (consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro/a).
 - enfermedad del riñón grave o enfermedad del hígado moderada o grave.
 - si está embarazada.

Advertencias y precauciones

Antes de tomar Cilosvitae, asegúrese de que su médico sepa:

- si sufre algún problema del corazón grave o cualquier trastorno de los latidos del corazón.
- si sufre algún trastorno de la tensión arterial.

Durante el tratamiento con Cilosvitae asegúrese que:

- En caso de que tenga que someterse a una intervención quirúrgica, incluida la extracción de piezas dentales, informe a su médico o dentista de que está tomando Cilosvitae.
- Si sufre moratones o hemorragias con facilidad, deje de tomar Cilosvitae e informe a su médico.

Toma de Cilosvitae con otros medicamentos

Antes de empezar a tomar Cilosvitae, informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los medicamentos de venta sin receta médica.

Debe informar específicamente a su médico si toma medicamentos que habitualmente se toman para tratar afecciones dolorosas y/o inflamatorias en los músculos o en las articulaciones, así como si toma medicamentos para disminuir la coagulación de la sangre. Entre estos medicamentos se encuentran:

- ácido acetilsalicílico
- clopidogrel
- medicamentos anticoagulantes (por ej., warfarina, dabigatrán, rivaroxabán, apixabán o heparinas de bajo peso molecular).

En caso de que esté tomando dichos medicamentos con Cilosvitae, es posible que su médico tenga que realizarle algunos análisis de sangre rutinarios.

Determinados medicamentos pueden interferir con el efecto de Cilosvitae cuando se toman conjuntamente. Pueden aumentar los efectos secundarios de Cilosvitae o bien reducir su eficacia. Cilosvitae puede tener estos mismos efectos sobre otros medicamentos. Antes de empezar a tomar Cilosvitae, informe a su médico o farmacéutico si está tomando:

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**CILOSVITAE COMPRIMIDOS 50 mg**

- eritromicina, claritromicina o rifampicina (antibióticos);
- ketoconazol (para tratar infecciones producidas por hongos);
- omeprazol (para tratar el exceso de ácido en el estómago);
- diltiazem (para tratar la tensión arterial alta o el dolor en el pecho);
- cisaprida (para tratar algunos trastornos del estómago);
- lovastatina, simvastatina o atorvastatina (para tratar el colesterol alto en la sangre);
- halofantrina (para tratar la malaria);
- pimozida (para tratar trastornos mentales);
- derivados del cornezuelo (para tratar las migrañas, por ej., ergotamina, dihidroergotamina);
- carbamazepina o fenitoína (para tratar las convulsiones);
- hipérico o hierba de San Juan (producto fitoterapéutico).

Si tiene dudas sobre si esto se aplica a los medicamentos que esté tomando, consulte a su médico o farmacéutico.

Antes de empezar a tomar Cilosvitae, informe a su médico o farmacéutico si está tomando medicamentos para tratar la tensión arterial alta, ya que Cilosvitae puede tener un efecto de bajada de la tensión arterial adicional. En caso de que su tensión arterial disminuya excesivamente, podría sufrir una aceleración de los latidos del corazón. Entre estos medicamentos se encuentran:

- Diuréticos (por ej., hidroclorotiazida, furosemida)
- Antagonistas del calcio (por ej., verapamilo, amlodipino)
- Inhibidores de la ECA (por ej., captopril, lisinopril)
- Antagonistas de los receptores de la angiotensina II (por ej., valsartán, candesartán)
- Betabloqueantes (por ej., labetalol, carvedilol).

Es posible que pueda tomar los medicamentos antes mencionados junto con Cilosvitae. Su médico decidirá si esto resulta adecuado en su caso.

Toma de Cilosvitae con alimentos y bebidas

Debe tomar los comprimidos de Cilosvitae 30 minutos antes del desayuno y la cena. Tome siempre los comprimidos acompañados de un vaso de agua.

Embarazo, lactancia y fertilidad

NO TOME Cilosvitae durante el embarazo.

NO SE RECOMIENDA tomar Cilosvitae durante la lactancia materna.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Cilosvitae puede causar mareos. Si se siente mareado después de tomar Cilosvitae, **NO** conduzca ni use ninguna herramienta o máquina e informe a su médico o farmacéutico.

3. Cómo tomar Cilosvitae

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**CILOSVITAE COMPRIMIDOS 50 mg**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es de dos comprimidos de 50 mg dos veces al día (por la mañana y por la noche). No es necesario modificar esta dosis para los pacientes de edad avanzada. Sin embargo, su médico podría recetarle una dosis más baja si usted está tomando otros medicamentos que pudieran interferir con el efecto de Cilosvitae.

Debe tomar los comprimidos de Cilosvitae 30 minutos antes **o dos horas después** del desayuno y la cena. Tome siempre los comprimidos acompañados de un vaso de agua.

En ocasiones puede notar los beneficios de tomar Cilosvitae a las 4 a 12 semanas de tratamiento. A los 3 meses de tratamiento, su médico evaluará su progreso y podría recomendarle que deje de tomar cilostazol si el efecto del tratamiento no es suficiente.

Cilosvitae no es adecuado para niños.

Si toma más Cilosvitae de lo que debe

En caso de que tome por cualquier motivo más comprimidos de Cilosvitae de los que debiera, puede presentar síntomas como dolor de cabeza agudo, diarrea, bajada de la tensión arterial e irregularidades de los latidos del corazón.

En caso de que tome más comprimidos de la dosis prescrita, póngase en contacto inmediatamente con su médico o con el hospital más cercano. Recuerde llevar consigo el envase para que quede claro qué medicamento ha tomado.

También puede llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Cilosvitae

No se preocupe si se olvida de tomar una dosis. Espere hasta la siguiente dosis y siga tomando el tratamiento con normalidad. **NO** tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con Cilosvitae

Si deja de tomar Cilosvitae, el dolor en sus piernas puede volver a empeorar. Por consiguiente, solamente debe dejar de tomar Cilosvitae si detecta efectos adversos que requieran una atención médica de urgencia (ver sección 4) o si así se lo indica su médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Cilosvitae puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si sufre cualquiera de los siguientes efectos adversos, es posible que necesite recibir atención médica urgente. Deje de tomar Cilosvitae y póngase en contacto con un médico o acuda inmediatamente al hospital más cercano.

- apoplejía (ictus)

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**CILOSVITAE COMPRIMIDOS 50 mg**

- infarto de miocardio (ataque al corazón)
- problemas en el corazón, que pueden causar dificultad para respirar o inflamación de los tobillos
- irregularidades en los latidos del corazón (nueva o empeoramiento)
- hemorragia destacable
- facilidad para sufrir moratones
- enfermedad grave con formación de ampollas en la piel, la boca, los ojos o los genitales
- color amarillento en la piel o en el blanco de los ojos debido a problemas en el hígado o en la sangre (ictericia).

También debe informar inmediatamente a su médico si presenta fiebre o dolor de garganta. Es posible que se le tengan que realizar análisis de sangre; su médico decidirá el tratamiento que se le debe administrar.

Se han observado los siguientes efectos adversos en pacientes tratados con Cilosvitae. Si los sufre, debe informar inmediatamente a su médico:

Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

- dolor de cabeza
- heces anormales
- diarrea

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- latidos del corazón rápidos
- palpitaciones del corazón
- dolor en el pecho
- Mareo
- dolor de garganta
- rinorrea o goteo de la nariz (rinitis)
- dolor en el abdomen
- molestias en el abdomen (indigestión)
- sensación de malestar en el estómago (náuseas o vómitos)
- pérdida de apetito (anorexia)
- exceso de gases o flatulencia
- inflamación de los tobillos, los pies o la cara
- erupción o cambios del aspecto de la piel
- picor en la piel
- parches hemorrágicos en la piel
- debilidad general

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- ataque al corazón (infarto de miocardio)
- irregularidades en los latidos del corazón (nuevas o empeoramiento)
- problemas en el corazón que pueden provocar dificultad para respirar o inflamación de los tobillos
- neumonía
- tos
- escalofríos
- hemorragia inesperada
- tendencia a sangrar (p. ej., en el estómago, los ojos o los músculos, sangrado de la nariz o presencia de sangre en el esputo o en la orina)
- disminución de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**CILOSVITAE COMPRIMIDOS 50 mg**

- mareo al ponerse de pie
- desmayo
- ansiedad
- dificultad para conciliar el sueño
- sueños anormales
- reacción alérgica
- dolor y molestias
- diabetes y aumento de la concentración de azúcar en la sangre
- dolor del estómago (gastritis)
- malestar general

Las personas diabéticas pueden correr un mayor riesgo de hemorragia ocular.

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)

- tendencia a sangrar durante más tiempo de lo normal
- aumento de la concentración de plaquetas en la sangre
- problemas en los riñones

Los siguientes efectos adversos se han observado durante la toma de Cilosvitae, pero se desconoce la frecuencia con la que se producen:

- cambios en la tensión arterial
- disminución de la concentración de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en la sangre
- dificultad para respirar
- dificultad para desplazarse
- fiebre
- sofocos
- eccema y otras erupciones en la piel
- disminución de sensación en la piel
- ojos llorosos o pegajosos (conjuntivitis)
- pitidos en los oídos (acúfenos)
- problemas en el hígado incluida hepatitis
- cambios en la orina

5. Conservación de Cilosvitae

Mantener Cilosvitae fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice Cilosvitae después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y el blister después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.

Almacenar a no más de 25°C.

Importado por Galenicum Health Chile SpA, Av. Las Condes N° 7700, of. 903-B Las Condes, Santiago-Chile.

Fabricado por Adamed Pharma S.A., ul. Marszałka Josefa Pilsudskiego 5, 95-200 Pabianice – Polonia.