



PASTEUR

Metropast 1000 Supositorios Metronidazol 1000 mg Caja x 5 Supositorios.





¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?

Tratamiento de vaginitis producidas por tricomonas y vaginitis no especificadas.

¿Requiere indicación médica?

Dispensación sujeta a prescripción médica.

¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?

Por vía oral se debe tomar durante las comidas. Use sólo por indicación y bajo supervisión médica. No use por más de 10 días sin control médico.

METROPAST 1000®

Laboratorio: PASTEUR

Drogas:

- Metronidazol

Acciones:

- Antiinfecciosos de Uso Sistémico: Antibacterianos
- Antiinfecciosos de Uso Sistémico: Antiprotozoarios

Acciones:

- Cada supositorio contiene: Metronidazol 1.000 mg.
- Anaerobocida.
- **En profilaxis quirúrgica:** 1 supositorio 2 horas antes del acto quirúrgico y continuar con 1 supositorio cada 8 horas, por 48 horas o hasta restablecer la vía oral. En tratamiento: la dosis recomendada es de 1 supositorio cada 8 horas o por 48 horas o hasta restablecer la vía oral.



- Envase conteniendo 5 supositorios.