

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE**PRODEL****COMPRIMIDOS ~~4 mg~~ JARABE 2 mg / 5 mL**
CLORFENAMINA MALEATO
LABORATORIO PASTEUR S.A.

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPRIMIDOS**Composición:**~~Cada comprimido contiene:~~~~Clorfenamina maleato 4 mg~~~~Excipientes c.s.: Almidón de Maíz, Lactosa Monohidrato, Polividona, Magnesio~~~~Estearato, Glicolato sódico de almidón.~~**JARABE****Composición:**

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Clorfenamina maleato 2 mg


Excipientes c.s.: Metilparabeno, Propilenglicol, Esencia de plátano, Esencia de vainilla, Colorante FD&C amarillo N°5, Sacarosa, Agua purificada.

INDICACIONES

Este medicamento es utilizado para el tratamiento y profilaxis de rinitis alérgica estacional y perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica. Fiebre de Eno
Manifestaciones alérgicas cutáneas no complicadas: urticaria y angioedema.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA

Antihistamínico.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**Mayores de 60 años.**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de este medicamento; que pueden ser dificultad para orinar, confusión, mareos, irritabilidad, sequedad de boca, nariz y garganta, por lo que se recomienda una especial vigilancia.

Consumo de alcohol.

Debe evitar tomar alcohol mientras esté en tratamiento con este medicamento, ya que se intensifican los efectos adversos tales como somnolencia, fatiga.

Manejo de vehículos.

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos, somnolencia y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

Embarazo.

Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

Lactancia.

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al niño, por lo que debe consultar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

Lactantes y niños.

No debe utilizarlo en niños menores de 2 años. Los niños son más sensibles a los efectos adversos de este medicamento, en algunos niños este medicamento produce excitación, el pediatra debe evaluar el tratamiento recomendable para su niño.

Precauciones especiales.

Este medicamento puede causar sequedad de boca, la cual puede aliviarse chupando caramelos.

Evite el consumo de otros medicamentos que le provoquen sueño como medicamentos para dormir, relajantes musculares, tranquilizantes, etc.

Antes de hacerse un examen de alergia a la piel debe avisarle al profesional de la salud a cargo que usted está tomando este medicamento.

CONTRAINDICACIONES

Si ha presentado síntomas de alergia a clorfenamina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

INTERACCIONES

Medicamentos.

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: anticolinérgicos como atropina, butilescopolamina, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, clomipramina, antidepresivos como moclobemida, tranilcipromina, medicamentos que contengan alcohol, bepridil.

Enfermedades.

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de úlcera estomacal, obstrucción intestinal, hipertiroidismo, aumento de la presión intraocular, asma, dificultad para orinar y glaucoma.

REACCIONES ADVERSAS

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: fiebre, fatiga extrema, hemorragias, úlceras sangrantes en el recto, la boca y vagina.

Otros efectos.

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: somnolencia, espesamiento de las secreciones bronquiales, sequedad de garganta y boca, visión borrosa, dificultad para orinar, pérdida de apetito, náuseas, dolor de estomago leve, vértigo leve, dolor de cabeza, nerviosismo, debilidad.

DOSIFICACIÓN

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Adultos y niños mayores de 12 años: 4 mg 3 o 4 veces al día (10 mL de jarabe).
 - Niños entre 12 y 6 años: 2 mg 3 o 4 veces al día (5 mL de jarabe).
 - Niños entre 2 y 6 años: 1 mg 3 o 4 veces al día (2,5 mL de jarabe).
- Puede tomarlo en conjunto con comidas o leche.

Uso prolongado.

El uso prolongado de este medicamento es posible solo bajo supervisión periódica (frecuente) de su médico, quién debe evaluar si sigue con la misma dosis y el mismo tratamiento.

SOBREDOSIFICACIÓN

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: somnolencia marcada, pupilas dilatadas, excitabilidad excesiva, confusión, pérdida de la coordinación, pulso debilitado, pérdida de conciencia. **hipotensión, coma y ocasionalmente convulsiones que son difíciles de tratar, incluso causar la muerte.**

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco a no más de 25° C.

No dejar al alcance de los niños.

Mantener en su envase original.

No use este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

PRESENTACION

Frascos con 120 mL de jarabe.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MÉDICA
NO RECOMIENDE ESTE TRATAMIENTO A OTRA PERSONA**

Fabricado y distribuido por:
Laboratorio Pasteur S.A.
I. Serrano 568, concepción.
www.lpasteur.cl

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**