


FOLLETO DE INFORMACION MEDICA

ESPASMOLITICOS

COMPRIMIDOS

LABORATORIO PASTEUR LTDA.



DESCRIPCION:


Atropina Sulfato es un alcaloide parasimpaticolítico aislado de la Atropa Belladonna que corresponde químicamente a $C_{20}H_{27}NO_3 \cdot H_2O$. Se presenta como una mezcla racémica de l- y d-hyosciamina.

Papaverina Clorhidrato es un alcaloide aislado del opio que corresponde químicamente a $C_{20}H_{22}ClNO_4$.

COMPOSICION:

Cada comprimido de espasmolítico contiene:

Atropina Sulfato
Papaverina Clorhidrato
Excipientes c.s.



ACCIONES:

Atropina sulfato posee acciones farmacológicas asociadas a los antimuscarínicos, resultando esencialmente de la actividad antimuscarínica de la l-hyosciamina.

Inhibe competitivamente las acciones de acetilcolina y otros estímulos colinérgicos en los efectores autonómicos que inervan los nervios colinérgicos postganglionares.

Posee diversos efectos antisecretores en el tracto gastrointestinal, disminuye el tono y amplitud de las contracciones uterinas y de la vejiga aunque el músculo de la vejiga es menos sensible a los efectos antimuscarínicos que otros músculos lisos (por ej. gastrointestinal). Posee efectos a nivel cardiovascular que son dependientes de la dosis; dosis normales producen una ligera disminución en la frecuencia cardíaca atribuible a una estimulación vagal mientras que dosis mayores pueden causar una taquicardia progresiva por bloqueo de la inhibición vagal normal del nodo sinusal.

Papaverina clorhidrato posee un efecto espasmolítico en la musculatura lisa, siendo más pronunciado en los vasos sanguíneos, incluyendo arterias coronarias, cerebrales, pulmonares y periféricas. También relaja la musculatura lisa de bronquios, tracto gastrointestinal, útero y sistema biliar.

INDICACIONES:

CONTRAINDICACIONES:

EFEITOS ADVERSOS:

POSOLOGIA:

PRESENTACION:

es al día, según la

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA
Departamento de Control Nacional
Sección Registro de Especialidades Farmacéuticas

*prescripción en
receta*

Precaución en el uso. Se debe usar con precaución en
pacientes mayores de 40 años ya que puede precipitar un
ataque de angina pectoris. En los mismos en pacientes con
hipertensión arterial o enfermedades cardíacas y riñones
menores.

COLODO PARA REFORMA EN MEDICA
EXCLUSIVAMENTE NO 6
ENVASE DE VENTA AL PUBLICO.

Jul 28/07/84-