



Clatic Claritromicina 250 mg /5 mL Suspensión Oral 80 mL



CLATIC®
Laboratorio: PASTEUR

Drogas:

- Claritromicina



Acciones:

- Antiinfecciosos de Uso Sistémico:Antibióticos:Macrólidos

Acciones:

- **Suspensión oral 125 mg/5 ml:** cada 5 ml contiene: Claritromicina 125 mg. **Suspensión oral 250 mg/5 ml:** cada 5 ml contiene: Claritromicina 250 mg.
- La claritromicina está indicada para el tratamiento de infecciones producidas por organismos sensibles. Estas infecciones incluyen: infecciones del tracto respiratorio bajo (por ej.: bronquitis, neumonía). Infecciones del tracto respiratorio alto (por ej.: faringitis y sinusitis). Infecciones de piel y tejido subcutáneo (por ej.: foliculitis, celulitis y erisipela). Infecciones diseminadas o localizadas por *Mycobacterium avium* o *Mycobacterium intracellulare*. Infecciones localizadas debidas a *Mycobacterium chelonae*, *Mycobacterium fortuitum* o *Mycobacterium kansasii*. La claritromicina en presencia de supresión ácida también está indicada en la erradicación de *Helicobacter pylori*, con el resultado de la disminución de la recurrencia de úlcera duodenal.
- La duración habitual del tratamiento va a depender del patógeno causal y de la gravedad. Pacientes con disminución de la función renal, la dosis de claritromicina debe ser ajustada.
- **Suspensión pediátrica 125 mg/5 ml:** envase conteniendo 80 ml, con jeringa dosificadora (exactidose). **Suspensión pediátrica 250 mg/5 ml:** envase conteniendo 80 ml, con jeringa dosificadora (exactidose).