

# Congestex Paracetamol 400 mg 10 Cápsulas



# **CONGESTEX CAPSULAS**

Laboratorio: ABBOTT

# Drogas:

- Ascórbico, ácido
- Noscapina
- Paracetamol
- Pseudoefedrina

### Acciones:

- Aparato Respiratorio: Antitusivos Expectorantes Mucolíticos
- Otorrinolaringológicos:Descongestivos Nasales Antialérgicos
- Sistema Nervioso Central: Analgésicos Antitérmicos

### Acciones:

 Cada cápsula contiene: Paracetamol 400.0 mg; Pseudoefedrina Clorhidrato 60.0 mg; Noscapina 9.189 mg; Ácido Ascórbico (Vitamina C) 50.0 mg.



- Alivio de los síntomas y las molestias propios en gripe, resfríos y condiciones alérgicas que afectan las vías respiratorias.
- La dosis usual recomendada es: Adultos: Administrar 1 cápsula 3 a 4 veces al día, según necesidad. Dosis máxima diaria: No se deben administrar más de 4 cápsulas.
- Antecedentes de hipersensibilidad al paracetamol, la aspirina, la pseudoefedrina, la noscapina, la vitamina C o a cualquiera de los excipientes de la formulación. Enfermedad hepática, renal o pulmonar. Hipertensión arterial severa o enfermedad arterial coronaria severa. Insuficiencia respiratoria, asma o tos productiva. Pacientes bajo tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa o dentro de los 14 días de haber suspendido su administración. Embarazo y lactancia. Diabetes mellitus e hipertrofia prostática.
- No administrar a niños menores de 12 años sin una indicación médica. No administrar por más de 5 días en caso de dolor, por más de 3 días en caso de fiebre, o por más de 2 días en caso de dolor de garganta, sin consultar al médico. El uso prolongado y de altas dosis de paracetamol puede provocar severo daño hepático. Este medicamento no debe ser usado si se ha administrado un IMAO, como furazolidona o procarbazina, en los últimos 14 días, puede ocurrir una interacción que puede ocasionar efectos secundarios graves.
- Se han descrito interacciones con los siguientes productos, entre otros: Medicamentos inhibidores de la monoaminoxidasa; barbitúricos; alcohol, medicamentos para hipertensión arterial; anticoagulantes, aspirina u otros salicilatos; antiinflamatorios no esteroidales; diflunisal; carbamazepina, fenitoína; rifampicina, digoxina.
- Envase conteniendo 10 cápsulas.