

CORODIN

ABBOTT

Antihipertensivo. Bloqueador de la angiotensina II.

Composición.

CORODIN 50mg: cada comprimido recubierto contiene: losartán potásico 50mg. CORODIN 100mg: cada comprimido recubierto contiene: losartán potásico 100mg.

Indicaciones.

CORODIN 50 mg y CORODIN 100mg están indicados en el tratamiento de la hipertensión y pueden ser usados solos o en combinación con otros agentes antihipertensivos. Para reducir la proteinuria y retardar la progresión de la enfermedad renal en pacientes con diabetes tipo 2 e historial de hipertensión.

Dosificación.

Losartán se administra por vía oral y a pesar que los alimentos pueden disminuir la velocidad de absorción de Losartán y su concentración máxima plasmática, la magnitud de estos efectos no tiene importancia clínica. La dosis de Losartán debe ser individualizada y ajustada de acuerdo a la respuesta clínica del paciente. La dosis de inicio en adultos es de 50 mg una vez al día. En pacientes que presenten una depleción de volumen o que tengan historia de insuficiencia hepática se recomienda comenzar con dosis de 25 mg al día. La dosis de mantención se encuentra en el rango de 25 a 100 mg al día, administrados en una toma única diaria o dividida en dos tomas. En el caso de que no exista respuesta adecuada a Losartán solo, se deberá considerar la administración conjunta de bajas dosis de diurético.

Presentación.

CORODIN 50mg: envase calendario con 30 comprimidos recubiertos.
CORODIN 100mg: envase calendario con 30 comprimidos recubiertos.

CORODIN-D

CORODIN-D FORTE

ABBOTT

Antihipertensivo. Bloqueador de la angiotensina II. Diurético.

Composición.

CORODIN-D: cada comprimido recubierto contiene: losartán potásico 50mg; hidroclorotiazida 12.5mg. CORODIN-D FORTE: cada comprimido recubierto contiene: losartán potásico 100mg; hidroclorotiazida 25mg.

Indicaciones.

Tratamiento de mantención en hipertensión arterial.

Dosificación.

Corodin D: 1 comprimido, una vez al día o según prescripción médica. Corodin D Forte: Para pacientes que no respondan adecuadamente a Corodin D. 1 comprimido al día. Dosis máxima recomendada: 1 comprimido al día.

Presentación.

CORODIN-D: envase calendario con 30 comprimidos recubiertos. CORODIN-D FORTE: envase calendario con 30 comprimidos recubiertos.